

Production of embryonic stem like-cells from neonatal mouse testis after exposure to low-intensity ultrasound

Arian Azimi¹, Zohreh Mazaheri^{2*}, Mansoureh Movahedin³

1- M.Sc., Department of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2- Assistant Professor, Department of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3- Professor, Department of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

*Corresponding Address: Postal Code: 1411713116, Department of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Email: z_mazaheri@modares.ac.ir

Received: 22/Feb/2017, Accepted: 19/Sep/2017

Abstract

Objective: Pluripotent stem cells derived from testis are a new, unlimited source for cell therapy in regenerative medicine. Recently, studies show that spermatogonial stem cells can form embryonic stem-like cells (ES-like cells) in vitro. New procedures such as low intensity ultrasound (LIUS) can have positive effects on cell growth and differentiation. However, the effect of LIUS stimulation on ES-like cells has not been explored. In this study we investigate the effects of LIUS on colonization of ES-like cells.

Methods: Initially, we isolated SSCs from neonatal mice. The spermatogonial and Sertoli cells were cultured together in DMEM/F12 supplemented with 15% fetal bovine serum (FBS) and leukemia inhibitory factor (LIF). ES-like cells were stimulated by LIUS at intensity doses of 200 milliwatt/square centimeter (mW/cm^2) over 5 days. Characteristics of the isolated cells were confirmed by immunocytochemistry with Sox2 and SSEA-1 protein for ES-like cells. We also investigated colonization features in the ES-like cells.

Results: After 21 days, we observed there was a significant increase in diameter and number of colonies in the 200 mW/cm^2 group compared to the control group ($p \leq 0.05$). Pluripotency proteins, ES-like cell marker Sox2, and SSEA-1 expressed in the ES-like cells.

Conclusion: LIUS treatment can be an efficient, cost-effective method to improve colonization of ES-like cells during culture.

Keywords: Spermatogonial stem cells, Embryonic stem-like cells, Low intensity ultrasound (LIUS), Neonatal mouse

Pathobiology Research, Vol. 20 (2017), No.3, Pages: 49-60

ایجاد سلول‌های بنیادی شبه جنینی از بیضه موش نوزاد پس از تابش امواج فراصوت با شدت پایین

آرین عظیمی^۱، زهره مظاهری^{۲*}، منصوره موحدین^۳

۱- کارشناس ارشد، گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲- استادیار، گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳- استاد، گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

*آدرس نویسنده مسئول: ایران، تهران، کدپستی: ۱۴۱۷۱۳۱۱۶، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه علوم تشریح

Email: z_mazaheri @modares.ac.ir

پذیرش مقاله: ۹۶/۰۶/۲۸

دریافت مقاله: ۹۵/۱۲/۰۴

چکیده

هدف: سلول‌های بنیادی پرتوان مشتق شده از بافت بیضه، یک منبع بسیار غنی و جدیدی برای سلول درمانی در پزشکی بازساختی هستند. مطالعات اخیر نشانگر آن است که سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در شرایط آزمایشگاهی می‌توانند به سلول‌های بنیادی شبه جنینی تغییر یابند. استفاده از امواج فراصوت با شدت پایین، آثار مثبتی روی رشد و تمایز سلول‌ها دارد. هدف از این مطالعه تأثیر امواج فراصوت روی کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی شبه جنینی است. مواد و روش‌ها: ابتدا، سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی از بیضه نوزاد موش جدا شدند. بعد از کشت دادن این سلول‌ها در محیط DMEM/F12، حاوی ۱۵ درصد سرم جنین گاوی و عامل مهارکننده لوسمی، توسط امواج فراصوت با شدت ۲۰۰ (میلی وات بر سانتی متر مربع) به مدت ۵ روز تحت تابش قرار گرفتند. سلول‌های بنیادی شبه جنینی توسط نشانگرهای Sox2 و SSEA-1 تأیید شده و مشخصه‌های کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی شبه جنینی ارزیابی شدند. نتایج: نتایج نشان داد که افزایش معنی‌داری در قطر و تعداد کلونی‌های سلول‌های بنیادی شبه جنینی در گروه تابش نسبت به گروه کنترل وجود دارد ($P \leq 0/05$). نشانگرهای پروتئینی پرتوانی سلول‌های بنیادی شبه جنینی از قبیل Sox2 و SSEA-1 بیان شدند. نتیجه‌گیری: امواج فراصوت با شدت پایین می‌تواند روش مناسب و کم هزینه‌ای در بهبود بخشیدن کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی شبه جنینی در زمان کشت باشد.

کلیدواژگان: سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی، سلول‌های بنیادی شبه جنینی، امواج فراصوت، موش نوزاد

پژوهش‌های آسیب شناسی زیستی، دوره ۲۰، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶، صفحات: ۴۹-۶۰

مقدمه

از دست رفته یا آسیب‌دیده بدن شوند [۱]. از جمله سلول‌های بنیادی که برای درمان و مسایل تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (Spermatogonial

طی دو دهه گذشته، بسیاری از محققین، فرآیندهایی را مطرح کردند تا به کمک آن بتوانند سلول‌های بنیادی پرتوان را به انواع سلول‌های تخصصی تبدیل کرده تا جایگزین سلول‌های

تحریک مکانیکی موضعی برای هدایت فعالیت گیرنده‌های کششی سلول‌های غشا، کانال‌های یونی و ایتگرین‌ها (Integrins) (پیام‌های خارج سلولی) را دارند. علاوه بر اهداف تشخیصی امواج فراصوتی، در سال ۱۹۲۷ استفاده درمانی از این امواج توسط وود (Wood) مطرح و مطالعات روی توانایی‌های درمانی آن آغاز شد [۱۵]. امواج فراصوت، نوع خاصی از امواج صوتی با فرکانس بسیار بالا (۲ تا ۲۰ کیلو هرتز) و خارج از محدوده شنوایی انسان است. این گونه امواج هنگام عبور از بافت‌های زیستی، طیفی از اثر بخشی خود را ایجاد می‌نمایند [۱۶]. در گذشته امواج فراصوت عموماً به صورت بالینی و به‌عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده می‌شد، ولی امروزه مشخص شده که این امواج فواید درمانی نیز دارد. امواج فراصوت می‌توانند باعث تسهیل انتقال و تحویل دارو یا ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده شود. همچنین به دلیل غیرتهاجمی بودن و عوارض جانبی کمی که دارد، خود را از دیگر درمان‌های فیزیکی متمایز ساخته‌اند [۱۷]. تاکنون مطالعه‌ای در خصوص تأثیر امواج فراصوت با شدت پایین، روی القای سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی و تغییر آن به سلول‌های بنیادی شبه جنینی صورت نگرفته است. لذا با توجه به نقش مهم سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی و سلول‌های بنیادی شبه جنینی، در این مطالعه سعی بر آن شده است تا تأثیر امواج فراصوت با شدت پایین روی بقا و کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی شبه جنینی بررسی شود.

مواد و روش‌ها

گروه‌بندی

در این مطالعه، دو گروه شامل کنترل (بدون تابش امواج فراصوت) و آزمایش (گروه تابش امواج فراصوت پیوسته) در نظر گرفته شدند. در گروه آزمایشی، از محیط کشت ۱۵ درصد سرم حاوی سلول‌های بنیادی شبه جنینی، تحت تابش امواج فراصوت پیوسته ۱ مگاهرتز، با شدت ۲۰۰ میلی‌وات بر

stem cells) هستند. فرآیند اسپرم‌زایی با تمایز در سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی آغاز شده و با انجام تقسیم میتوز در آن‌ها، و تقسیم میوزی همراه با تغییر ریخت شناسی که در اسپرماتوسیت‌ها (Spermatocytes) صورت می‌پذیرد، در نهایت منجر به تولید اسپرماتوزا (Spermatozoa) می‌شود. سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی قرار گرفته روی غشای پایه لوله‌های منی‌ساز، مسئول روند اسپرم‌زایی هستند [۲]. در شرایط درون بدن (In vivo)، تجدیدپذیری و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی توسط عوامل خارجی، یعنی محیط سوماتیک یا با برنامه ژنتیکی داخلی در سلول‌های زایا (Germinal cells) تنظیم می‌شود. سلول‌های سرتولی (Sertoli cells)، تنها سلول‌های سوماتیکی هستند که در لوله‌های منی‌ساز (Seminiferous tubules) حضور دارند. این سلول‌ها با حمایت از سلول‌های زایا و همچنین ترشح سیتوکینین‌هایی (Cytokinins) از قبیل عوامل حمایتی ایمنی، عوامل رشد و تغذیه‌ای نقش مهمی را ایفا می‌کنند [۳-۵]. اسپرماتوگونی از جمله سلول‌های پرتوانی (Pluripotent) است که در زمان جنینی از گونوسیت‌ها (Gonocytes) مشتق می‌شوند، سپس به داخل لوله‌های منی‌ساز مهاجرت می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی، علاوه بر تمایز به اسپرم، می‌توانند در محیط کشت‌های ویژه، به سلول بنیادی شبه رویانی نیز تمایز پیدا کنند [۶-۱۰]. بعضی از محققین از جمله، کاناتسو (Kanatsu) و همکارانش در سال ۲۰۰۴، جز اولین کسانی بودند که موفق شدند، سلول‌های بنیادی شبه جنینی (Embryonic stem like cells) را از سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی جدا کرده و از اصطلاح سلول‌های بنیادی رده زایای پرتوان (Multipotent germ line stem cells) استفاده نمایند [۶]. امروزه مطالعات جدیدی مبنی بر استفاده از القاگرهای زیستی، مانند امواج فراصوت با شدت پایین در شرایط آزمایشگاهی، برای تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی انجام پذیرفته است [۱۱-۱۴]. امواج فراصوت با شدت پایین، یک موج با فشار صوتی خاصی هستند که توانایی تولید

گرفت. تمامی مواد مصرف شده در این مطالعه از شرکت (Sigma, آلمان) تهیه شد.

برای هر بار جداسازی، ۱۵ سر نوزاد موش نر ۳ تا ۵ روزه نژاد NMRI، برای برداشتن بیضه استفاده قرار شد. بعد از کشتن حیوان، بیضه‌ها خارج و بعد از شست و شو در PBS (Phosphate buffered saline) به محیط کشت DMEM/F12 منتقل شدند. کپسول و بافت‌های اضافی مثل اپیدیدیم (Epididymis) برداشته شد و نمونه‌ها در محیط DMEM/F12 حاوی آنزیم (۰/۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر کلاژناز) به قطعات کوچک تری تقسیم شدند [۱۸-۲۰]. محیط کشت حاوی سلول و قطعات لوله‌های منی‌ساز به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ و سپس PBS بالای پلت خارج شد. در این مرحله پلت پیپتاژ شد و سوسپانسیون مورد نظر به مدت ۳ دقیقه با سرعت ۱۲۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شد. حاصل اولین مرحله هضم آنزیمی، قطعات لوله‌های منی‌ساز بود که برای هضم بیشتر وارد مرحله دوم هضم آنزیمی شد. در این مرحله ۱ میلی‌لیتر آنزیم تریپسین ۰/۱ درصد به پلت سلولی کف لوله فالكون اضافه شد. سپس به مدت ۶۰ ثانیه پیپتاژ شد تا اینکه سلول‌ها از یکدیگر جدا شوند. خشتی‌سازی توسط DMEM/F12 و ۱۵ درصد FBS و حاوی ۱۰۰ واحد LIF و ۱ میلی‌مولار بتا مرکاپتواتانول (beta Mercaptoethanol) انجام گرفت. سوسپانسیون سلولی که اغلب حاوی سلول‌های اسپرماتوگونی و سرتولی است، به صورت هم‌کشتی و بعد از شمارش سلولی با تعداد مساوی در ظروف ۳۵ میلی‌متری حاوی DMEM/F12 و ۱۵ درصد FBS، ۱۰۰ واحد LIF و ۱ میلی‌مولار بتا مرکاپتواتانول کشت داده شد. هر ۲ روز یک بار، تعویض محیط کشت انجام می‌پذیرفت.

کشت و ارزیابی کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی

شبه جنینی

بعد از کشت سلول‌های اسپرماتوگونی و سرتولی، ارزیابی کلونی‌های مشتق از سلول‌های شبه صورت پذیرفت. قبل از هر

سانتی‌متر مربع و زمان تابش ۲۰۰ ثانیه استفاده شد. جمعیت‌های سلولی در این مرحله به مدت ۲۱ روز کشت داده شدند و در روز هفتم و چهاردهم و بیست و یکم از نظر میزان متغیرهای کلونی‌زایی بررسی شد. در این تحقیق، جداسازی سلول‌های اسپرماتوگونی نوزاد موش، به منظور ایجاد سیستم هم‌کشتی آن‌ها با سلول‌های سرتولی، انجام پذیرفت. برای هر بار جداسازی، ۱۵ سر موش نوزاد نر ۳ تا ۵ روزه برای برداشتن بیضه به آزمایشگاه منتقل شدند. بیضه نوزاد موش‌ها در محیط کشت حاوی آنزیم‌های کلاژناز ۴ و سپس در تریپسین برای هضم آنزیمی به طور مکانیکی قطعه قطعه شد.

سپس سوسپانسیون سلولی، اسپرماتوگونی و سرتولی در محیط کشت مخصوص [DMEM/F12 (Dulbecco's Modified Eagles Medium/F12 (FBS (Fetal bovine serum) ۱۵ درصد، ۱۰۰ واحد LIF (Leukemia Inhibitors Factor) ۱ درصد اسیدهای آمینه غیر ضروری، بتا مرکاپتواتانول یک میلی‌مولار و پنی‌سیلین/استرپتومایسین ۱ درصد (Penicillin/streptomycin)] کشت داده شدند [۱۸]. امواج فراصوت پیوسته با شدت ۲۰۰ میلی‌وات بر سانتی‌متر مربع در مدت ۵ روز به این سلول‌ها تاییده شد. در پایان به منظور تأیید ماهیت سلول‌های بنیادی شبه جنینی از طریق ایمونوسیتوشیمی از برخی پروتئین‌های Sox2، SSEA-1 استفاده شد.

جداسازی و کشت سلول‌های اسپرماتوگونی

سلول‌های اسپرماتوگونی از بیضه نوزاد موش، طی دو مرحله هضم آنزیمی و مکانیکی جدا شدند. موش‌های نر و ماده نژاد NMRI (National Medical research institute) از مؤسسه رازی خریداری و در حیوانخانه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تحت شرایط مناسب نگهداری شدند. موش‌های نوزاد ۳ تا ۵ روزه برای جداسازی سلول‌ها، استفاده شدند. تمام روش‌های مورد استفاده در این مطالعه طبق موازین کمیته اخلاق پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس طبق شماره نامه ۵۲۵/۷۷۱۳ انجام



نقش امواج فراصوت در بازبرنامه‌ریزی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی

مگاهرتز و شدت ۲۰۰ میلی‌وات بر سانتی‌متر مربع، به‌مدت ۵ روز، انتخاب شدند [۲۰]. امواج فراصوت پیوسته و به‌وسیله دستگاه فراصوت (Ultrasound machine) (PHYSIOMED، آلمان) از طریق یک مبدل (Transducer) با سطح مقطع ۳۵ میلی‌متر و ژل واسط (Coupling Gel) که بین مبدل و ظرف کشت قرار داشت، در فضای داخل انکوباتور ۳۲ درجه و ۵٪ CO₂ درصد، به سلول‌ها تابیده شد (شکل‌های ۱ و ۲).


پاساژ سلولی که هر ۷ روز یک‌بار تکرار می‌شد، تعداد و قطر کلونی‌های آن به کمک میکروسکوپ معکوس (Ziess، آلمان) مجهز به عدسی چشمی مدرج (Ocular grid) به‌دست آمد. نتایج حاصل با تکرار حداقل ۳ بار برای محاسبه میانگین و انحراف معیار استفاده شد.

تابش امواج پیوسته فراصوت

روش تابش‌دهی و پارامترهای اولیه بر اساس فرکانس ۱



شکل ۱ (الف) روش تابش‌دهی امواج فراصوت روی سلول‌ها از ته ظرف کشت، نمای داخل انکوباتور، (ب) موقعیت مبدل و موقعیت پتری دیش روی مبدل [۲۰]



شکل ۲. روش تابش دهی امواج فرا صوت روی سلول‌ها، نمای خارج انکوباتور [۲۰]

شد. پس از ۳ بار شستشو با بافر فسفات هر بار به مدت ۵ دقیقه نمونه‌ها با گلیسرول فسفات چسبانده شد. از نمونه‌های رنگ شده به کمک میکروسکوپ فلورسنت تصویربرداری شد.

تجزیه و تحلیل آماری

تمام مقادیر بر حسب $\text{Mean} \pm \text{SE}$ ارائه شده است. اطلاعات به دست آمده از بررسی قطر و تعداد کلونی سلول‌ها توسط Student T-test و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (one way Analysis of variance: ANOVA) و آزمون توکی (TUKEY) مقایسه شد. سطح معنی‌داری $P \leq 0.05$ در نظر گرفته شد.

نتایج

القای سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی به

سلول‌های بنیادی شبه جنینی

نتایج مشاهده سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی که به مدت ۲۱ روز برای دستیابی به سلول‌های بنیادی شبه جنینی تحت القا قرار گرفته بودند به این صورت بود که طی این القا،

ارزیابی ایمونوسیتوشیمی سلول‌های بنیادی شبه


جنینی

برای تأیید کلونی‌های بنیادی شبه جنینی به دست آمده، از پروتئین‌های Sox2، SSEA-1 (Sigma، آمریکا) استفاده شد. ابتدا کلونی‌های کشت داده شده روی لام، دوبار و هر بار به مدت ۵ دقیقه در بافر فسفات شستشو شد. سپس برای ثبوت به مدت ۲۰ دقیقه در پارافرم‌آلدئید ۴ درصد قرار گرفت. پس از شستشو در بافر فسفات به مدت ۵ دقیقه برای تسهیل نفوذ آنتی‌بادی به داخل سلول، از تریتون X-100 (Triton x-100) ۲ درصد به مدت ۵ دقیقه استفاده شد. مهارسازی آن در سرم ۱۰ درصد به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انجام گرفت. سپس به کلونی‌ها، آنتی‌بادی اولیه آنتی‌بادی پلی‌کلونال SSEA-1 (Rabbit polyclonal bs-1702R-Cy7) و Sox2 (ab97959) به رقت ۱:۵۰ اضافه شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. بعد از این مرحله و سه بار شستشو با بافر فسفات و هر بار به مدت ۵ دقیقه، روی نمونه‌ها به مدت ۲ ساعت با آنتی‌بادی ثانویه آنتی‌بادی ثانویه کونژوگه با PE (Phycoerythrin) (Donkey to Rabbit) (IgG ab7007) به رقت ۱:۲۰۰ در تاریکی و دمای اتاق پوشیده

نقش امواج فراصوت در بازبرنامه‌ریزی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی

بیضی، کوچک و به هم فشرده بودند. این حالت تا روز ۲۱ کاملاً مشهود بود (شکل ۳).

کلونی‌های ایجاد شده برخلاف کلونی‌های اسپرماتوگونی، حاشیه مشخصی داشتند. اکثراً آن‌ها دارای شکلی کروی یا




شکل ۳ ریخت شناسی یک کلونی به دست آمده از کشت سلول‌های بنیادی شبه جنینی و سرتولی در روز ۲۱


نتایج تجزیه و تحلیل آماری بین گروهی، نشان داد که تعداد و قطر کلونی سلول‌های بنیادی شبه جنینی در گروه تابش امواج فراصوت پیوسته نسبت به گروه کنترل، در ۲۱ روز زمان کشت، افزایش معنی‌داری پیدا کرده است ($P \leq 0/05$). در حالی که بین نتایج درون گروهی در هفته‌های اول تا سوم و در دو گروه تابش امواج و بدون امواج نسبت به هم، از نظر آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ($P \geq 0/05$).

ارزیابی کمی کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی شبه جنینی

نتایج حاصل از بررسی روند کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی شبه جنینی در محیط کشت نشان داد که این سلول‌ها ابتدا تجمعات سلولی را شکل داده و در ادامه کلونی را ایجاد کرده‌اند. در این میان امواج فراصوت با پارامترهای ذکر شده باعث افزایش تعداد و قطر کلونی‌های سلول‌های بنیادی شبه جنینی شد (شکل ۴ و ۵).



شکل ۴ مقایسه روند تغییرات میانگین تعداد کلونی در دو گروه تابش و بدون تابش امواج،*: تفاوت معنی‌دار نسبت به گروه کنترل را نشان می‌دهد (\pm میانگین \pm SE). استاندارد)، $n=3$ ، $P \leq 0/05$.




شکل ۵ مقایسه روند تغییرات میانگین قطر کلونی میکرومتر در دو گروه تابش و بدون تابش امواج،*: تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل را نشان می‌دهد (SE±, P≤۰/۰۵, n=۳).

شد. نتایج حاصل از این بررسی، نشان داد که نشانگر مزبور بیان شد؛ در نتیجه ماهیت این سلول‌ها به اثبات رسید (شکل ۶-۸).


تأیید کلونی‌های سلول‌های بنیادی شبه جنینی

برای حصول اطمینان از ماهیت سلول‌های بنیادی شبه جنینی، از نشانگر اختصاصی Sox2، SSEA-1 استفاده




شکل ۶ بررسی نشانگر Sox2 در کلونی سلول‌های بنیادی شبه جنینی (ب)، شکل‌های (الف) و (ج) به ترتیب تصاویر DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) و ادغام شده (Merge)

نقش امواج فراصوت در بازبرنامه‌ریزی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی



شکل ۷ بررسی نشانگر *SSEA-1* در کلونی سلول‌های بنیادی شبه جنینی (ب). شکل‌های (الف) و (ج) به ترتیب تصاویر DAPI و ادغام شده



شکل ۸ بررسی نشانگر کونژوگه با *PE* در کلونی سلول‌های بنیادی شبه جنینی به عنوان گروه کنترل منفی (ب). شکل‌های (الف) و (ج) به ترتیب تصاویر DAPI و ادغام شده

بحث

در این مطالعه از موش ۳ تا ۵ روز استفاده شد. به دلیل این که موش (نژاد NMRI) نوزاد ۳-۵ روزه بهترین سن برای جداسازی سلول‌های اسپرماتوگونی نوع A است. اپی تلیوم لوله‌های منی‌ساز در موش ۶ روزه تنها دارای سلول‌های اسپرماتوگونی نوع A و سرتولی است، به طوری که ۱۶ درصد از سلول‌های اپی تلیوم را سلول‌های اسپرماتوگونی نوع A و ۸۴ درصد دیگر آن را سلول‌های سرتولی تشکیل می‌دهند. با افزایش سن، درصد این دو نوع سلول خصوصاً سلول‌های اسپرماتوگونی نوع A کاهش می‌یابد. بنابراین درجه خلوص سلول‌های بنیادی که یکی از زیر شاخه‌های سلول‌های اسپرماتوگونی نوع A است در اپی تلیوم منی‌ساز موش نوزاد در بالاترین سطح است [۲۱، ۲۲].

بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که امواج فراصوت پیوسته با شدت پایین قادر خواهد بود تا میزان کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی شبه جنینی را نسبت به گروه کنترل تحت تأثیر قرار دهد. این نتایج برای اولین بار نشان داد که سلول‌های بنیادی شبه جنینی ایجاد شده تحت تأثیر امواج فراصوت پیوسته با شدت پایین قادر است تا طی ۲۱ روز کشت، میزان کلونی‌زایی و قطر کلونی‌های ایجاد شده را به طور معنی داری افزایش دهد. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۹ توسط بعضی از محققین انجام گرفت مشخص شد که امواج فرا صوت با شدت پایین باعث بهبود تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف انسانی می‌شود. این گروه از محققین نشان دادند که امواج فرا صوت با شدت پایین به واسطه حداقل سه مکانیسم قادر است منجر به بهبود تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی شود. این مکانیسم‌ها شامل شل کردن بافت هم‌بند اطراف سلول، آزادسازی عوامل رشد خارج سلولی و افزایش حساسیت سلول‌ها به بعضی عوامل رشد خارج سلولی است [۲۳].

در مطالعه دیگری که در سال ۲۰۱۴ توسط عده‌ای از محققین انجام گرفت، مشخص شد که امواج فرا صوت پیوسته

و پالسی با شدت پایین می‌تواند بر تکثیر و کلونی‌زایی سلول‌های اسپرماتوگونی مؤثر باشد [۲۰، ۲۴]. از آنجایی که در مطالعه حاضر سلول‌های بنیادی شبه جنینی ایجاد شده از سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی ماهیت کلونی‌زایی داشتند و تنها از نظر ریخت شناختی با کلونی اسپرماتوگونی تفاوت داشتند، بنابراین به نظر می‌رسد که امواج فرا صوت با شدت پایین، طی ۲۱ روز توانسته با تأثیر بر مولکول‌های اتصالاتی سلولی منجر به افزایش تمایل بیشتر سلول‌ها به تشکیل کلونی شود و در نتیجه تعداد و قطر کلونی‌ها را نسبت به گروه کنترل بدون تابش افزایش دهد. این نتایج با آنچه که محققین حاضر به آن دست یافتند، از نظر تأثیر امواج بر تعداد کلونی هم‌خوانی دارد. هر چند که در مطالعه انجام شده آن‌ها، تنها اثر امواج روی سلول‌های اسپرماتوگونی بررسی شده و میزان قطر کلونی‌ها بدون تغییر بوده است.

امواج فرا صوت با شدت پایین به عنوان یک نمونه از انرژی مکانیکی غیر فیزیولوژیک، به طور غیر مستقیم، می‌تواند استرس مکانیکی به سلول‌های کشت داده شده را اعمال نماید، بنابراین به عنوان یکی از تحریک‌کننده‌های مکانیکی یا القاگر به حساب می‌آید [۲۵]. با توجه به نتایج به دست آمده در هفته‌ها و پاساژهای مختلف سلولی، به نظر می‌رسد که پاسخ‌دهی سلول‌ها به تأثیرات امواج در یک محدوده زمانی مشخص رخ می‌دهد. به این ترتیب که سلول به صورت دوره‌ای و در یک مقطع زمانی پس از پاسخ‌دهی به امواج دچار تغییرات ساختاری شده و بعد از این تغییر، قادر به ایجاد تغییراتی در رفتار سلولی از جمله کلونی‌زایی می‌شوند. به این ترتیب مشخص شد که کلونی‌زایی سلول‌های شبه جنینی، تحت تأثیر امواج فراصوت پیوسته با شدت پایین، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. به عبارت دیگر؛ تعداد و قطر کلونی‌ها در تمام طول مدت کشت، نسبت به گروه کنترل که امواجی دریافت نکرده بود، افزایش چشم‌گیری داشت. در هفته‌های دوم و سوم، نسبت به هفته اول، این روند مثبت ادامه نیافت و تعداد کلونی‌ها، با وجود اختلاف با گروه کنترل، ثابت باقی ماند.

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس بوده و با حمایت مالی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

به‌طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که امواج فراصوت با شدت پایین به‌عنوان یک روش کم‌هزینه و بدون عوارض جانبی برای بهبود غنی‌سازی سلول‌های بنیادی شبه جنینی در محیط آزمایشگاه می‌تواند استفاده شود.

منابع

- [1] Lanza R GJ, Hogan B, Melton D, Pederson R. Essentials of Stem Cell Biology. 2nd Edition, Elsevier Inc, 2009.
- [2] Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. *Cell* 2007; 131(5): 861-72.
- [3] Parks JE, Lee DR, Huang S, Kaproth MT. Prospects for spermatogenesis in vitro. *Theriogenology* 2003; 59(1): 73-86.
- [4] Huleihel M, Lunenfeld E. Regulation of spermatogenesis by paracrine/autocrine testicular factors. *Asian J Androl* 2004; 6(3): 259-68.
- [5] Roser JF. Regulation of testicular function in the stallion: an intricate network of endocrine, paracrine and autocrine systems. *Anim Reprod Sci* 2008; 107(3-4): 179-96.
- [6] Kanatsu-Shinohara M, Inoue K, Lee J, Yoshimoto M, Ogonuki N, Miki H, Baba S, Kato T, Kazuki Y, Toyokuni S, Toyoshima M, Niwa O, Oshimura M, Heike T, Nakahata T, Ishino F, Ogura A, Shinohara T. Generation of pluripotent stem cells from neonatal mouse testis. *Cell* 2004; 119(7): 1001-12.
- [7] Guan K, Nayernia K, Maier LS, Wagner S, Dressel R, Lee JH, Nolte J, Wolf F, Li M, Engel W, Hasenfuss G. Pluripotency of spermatogonial stem cells from adult mouse testis. *Nature* 2006; 440(7088): 1199-203.
- [8] Seandel M, James D, Shmelkov SV, Falcatori I, Kim J, Chavala S, Scherr DS, Zhang F, Torres R, Gale NW, Yancopoulos GD, Murphy A, Valenzuela DM, Hobbs RM, Pandolfi PP, Rafii S. Generation of functional multipotent adult stem cells from GPR125+ germline progenitors. *Nature* 2007; 449(7160): 346-50.
- [9] Kanatsu-Shinohara M, Lee J, Inoue K, Ogonuki N, Miki H, Toyokuni S, Ikawa M, Nakamura T, Ogura A, Shinohara T. Pluripotency of a single spermatogonial stem cell in mice. *Biol Reprod* 2008; 78(4): 681-7.
- [10] Ko K, Tapia N, Wu G, Kim JB, Bravo MJ, Sasse P, Glaser T, Ruau D, Han DW, Greber B, Hausdörfer K, Sebastiano V, Stehling M, Fleischmann BK, Brüstle O, Zenke M, Schöler HR. Induction of pluripotency in adult unipotent germline stem cells. *Cell Stem Cell* 2009; 5(1): 87-96.
- [11] Wu H, Ren K, Zhao W, Baojian GE, Peng S. Effect of electromagnetic fields on proliferation and differentiation of cultured mouse bone marrow mesenchymal stem cells. *J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci* 2005; 25(2): 185-7.
- [12] Eduardo Fde P, Bueno DF, de Freitas PM,

- Marques MM, Passos-Bueno MR, Eduardo Cde P, Zatz M. Stem cell proliferation under low intensity laser irradiation: a preliminary study. *Lasers Surg Med* 2008; 40(6): 433-8.
- [13] Schwartz Z, Simon BJ, Duran MA, Barabino G, Chaudhri R, Boyan BD. Pulsed electro-magnetic fields enhance BMP-2 dependent osteoblastic differentiation of human mesenchymal stem cells. *J Orthop Res* 2008; 26(9): 1250-5.
- [14] Sun LY, Hsieh DK, Yu TC, Chiu HT, Lu SF, Luo GH, Kuo TK, Lee OK, Chiou TW. Effect of pulsed electromagnetic field on the proliferation and differentiation potential of human bone marrow mesenchymal stem cells. *Bioelectromagnetics* 2009; 30(4): 251-60.
- [15] ter Haar G. Therapeutic applications of ultrasound. *Prog Biophys Mol Biol* 2007; 93(1-3): 111-29.
- [16] Lowry WE, Quan WL. Roadblocks en route to the clinical application of induced pluripotent stem cells. *J Cell Sci* 2010; 123(Pt 5): 643-51.
- [17] Graf U, Casanova EA, Cinelli P. The Role of the Leukemia Inhibitory Factor (LIF) - Pathway in Derivation and Maintenance of Murine Pluripotent Stem Cells. *Genes (Basel)* 2011; 2(1): 280-97.
- [18] Asadi MH, Javanmardi S, Movahedin M. Derivation of ES-like cell from neonatal mouse testis cells in autologous sertoli cells co-culture system. *Iran J Reprod Med* 2014; 12(1): 37-46.
- [19] Nazm Bojnordi M, Movahedin M, Tiraihi T, Javan M. Alteration in genes expression patterns during in vitro differentiation of mouse spermatogonial cells into neuroepithelial-like cells. *Cytotechnology* 2013; 65(1): 97-104.
- [20] Mohaqiq M, Movahedin M, Mokhtari Dizaji M, Mazaheri Z. Upregulation of Integrin- α 6 and Integrin- β 1 Gene Expressions in Mouse Spermatogonial Stem Cells after Continues and Pulsed Low Intensity Ultrasound Stimulation. *Cell J* 2018; 19(4): 634-639.
- [21] Bellvé AR, Cavicchia JC, Millette CF, O'Brien DA, Bhatnagar YM, Dym M. Spermatogenic cells of the prepuberal mouse. Isolation and morphological characterization. *J Cell Biol* 1977; 74(1): 68-85.
- [22] McLean DJ, Friel PJ, Johnston DS, Griswold MD. Characterization of spermatogonial stem cell maturation and differentiation in neonatal mice. *Biol Reprod* 2003; 69(6): 2085-91.
- [23] Yoon JH, Roh EY, Shin S, Jung NH, Song EY, Lee DS, Han KS, Kim JS, Kim BJ, Jeon HW, Yoon KS. Introducing pulsed low-intensity ultrasound to culturing human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells. *Biotechnol Lett* 2009; 31(3): 329-35.
- [24] Mohaqiq M, Movahedin M, Mokhtari Dizaji M, Mazaheri Z. The effect of Low-intensity Pulsed Ultrasound Stimulation on Neonate Mouse Spermatogonial Stem Cells. *Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology* 2013; 16(2): 85-94.
- [25] Iwashina T, Mochida J, Miyazaki T, Watanabe T, Iwabuchi S, Ando K, Hotta T, Sakai D. Low-intensity pulsed ultrasound stimulates cell proliferation and proteoglycan production in rabbit intervertebral disc cells cultured in alginate. *Biomaterials* 2006; 27(3): 354-61.