

Cloning, Expression and Purification of Mycolyltransferase C of *Mycobacterium tuberculosis* in the Prokaryotic Host

Haniyeh Aghababa¹, Ashraf Mohabbati Mobarez^{2*}, Mehrdad Behmanesh³, Nima Khoramabadi⁴, Mehdi Nejati⁵

1- M.Sc., Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2- Assistant Professor, Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3- Associated Professor, Department of Genetics, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4- Ph.D. Candidate, Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

5- Head Department of Bacterial Vaccines, Production and Research Complex, Pasteur Institute of Iran, Alborz, Iran

*Corresponding Address: P.O.Code: 1411713116, Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Email: mmmobarez@modares.ac.ir

Received: 24/May/2011, Accepted: 06/Dec/2011

Abstract

Objective: Antigen 85 complex of *Mycobacterium tuberculosis* includes three immunogenic proteins which are important TB vaccine candidates. The use of these protein as a component of subunit vaccines, as a part of DNA vaccines or recombinant BCG boosters, enhances their recombinant production. Recombinant production of these mycobacterial proteins located in the cell wall somehow differs from the other proteins, as they are partially apolar. Therefore, this study aims to produce recombinant Ag85C as a vaccine candidate.

Methods: Ag85C gene was cloned in pJET1.2 and subsequently in pET32a(+). Both recombinant plasmids were sequenced. Expression of the recombinant protein was induced with 1mM IPTG. Recombinant Ag85C was purified through dissolving the inclusions in 8M urea buffer, absorbed to Ni-NTA resins, washed by buffers with decreasing urea concentrations, and finally eluted in aqueous solution. Western blot analysis was performed using anti-6His tag antibody, rabbit anti-*M. tuberculosis* polyclonal antibody, and the serum from hospitalized TB patients.

Results: Ag85C successfully cloned in both plasmid vectors. The recombinant Ag85C expressed in the *E. coli* host and was purified with significant yield.

Conclusion: Western blot results along with that of sequencing ensure accurate production of recombinant Ag85C, retaining its partial epitopes.

Keywords: Ag85 Complex, Ag85C, Tuberculosis Vaccine, *Mycobacterium tuberculosis*

Modares Journal of Medical Sciences: *Pathobiology*, Vol 14, No 4, Winter 2012, Pages: 1-12

کلون، بیان و تخلیص مایکولیل ترانسفراز C مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در میزبان پروکاریوتی

هانیه آقابابا^۱، اشرف محبتی مبارز^{۲*}، مهرداد بهمنش^۳، نیما خرم آبادی^۴، مهدی نجاتی^۵

- ۱- کارشناس ارشد، گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
- ۲- دانشیار، گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
- ۳- دانشیار، گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
- ۴- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
- ۵- سرپرست بخش واکسن های باکتریایی، مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور، انستیتو پاستور ایران، البرز، ایران

آدرس نویسنده مسئول: ایران، تهران، کدپستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶، دانشگاه تربیت مدرس، گروه باکتری شناسی
Email: mmmobarez@modares.ac.ir

پذیرش مقاله: ۹۰/۰۹/۱۶

دریافت مقاله: ۹۰/۰۳/۰۴

چکیده

هدف: کمپلکس آنتی ژن ۸۵ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شامل سه پروتئین ترشحی است که خاصیت ایمنی زایی دارند. این پروتئین ها کاندیداهای مهمی در طراحی واکسن سل هستند. برای استفاده از این پروتئین ها به عنوان واکسن های زیرواحدی یا به عنوان یادآور برای BCG نو ترکیب یا واکسن های DNA، تولید آنتی ژن های پروتئینی به شکل نو ترکیب الزامی است. پروتئین های مایکوباکتریوم که در دیواره هستند نسبتاً غیرقطبی است و تولید آن ها به شکل نو ترکیب در سویه بیانی اشیرشیا کلی با پروتئین های دیگر متفاوت است. هدف از این مطالعه تولید و تخلیص آنتی ژن نو ترکیب 85C به عنوان یک ایمونوژن است. **مواد و روش ها:** آنتی ژن 85C در حامل پلاسمیدی pJET1.2 و در نهایت در pET32a(+) کلون و در هر دو پلاسمید تعیین توالی شد. القای تولید پروتئین با IPTG صورت گرفت و تخلیص با حل کردن اجسام توده ای داخل سلولی در اوره، جذب با رزین نیکل، حذف اوره با شیب کاهشی اوره در محلول های شستشو و در نهایت جمع آوری پروتئین نو ترکیب به شکل محلول انجام شد. تأیید آنتی ژنیک پروتئین نو ترکیب با وسترن بلات و توسط آنتی بادی ضد پلی هیستیدین، آنتی سرم پلی کلونال خرگوشی ضد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و سرم بیمار سلی بستر انجام شد. **نتایج:** ژن آنتی ژن 85C با موفقیت کلون و با تعیین توالی تأیید شد. آنتی ژن 85C در میزبان اشیرشیا کلی بیان و تخلیص شد. **نتیجه گیری:** نتایج وسترن بلات به موازات نتایج تعیین توالی نشان دهنده درستی تولید پروتئین آنتی ژن 85C نو ترکیب و حفظ نسبی ساختار اپی توپی آن است.

کلیدواژگان: کمپلکس آنتی ژن ۸۵، آنتی ژن 85C، واکسن سل، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی، دوره ۱۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، صفحات: ۱-۱۲

مقدمه

از جمعیت جهان با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (*Mycobacterium tuberculosis*) آلوده هستند و سالانه منجر به مرگ حدود ۲ میلیون نفر می شود [۱]. در ۹۰ درصد از افراد، عفونت به صورت نهفته باقی مانده و در ۱۰ درصد باقی

توبرکلوزیس (Tuberculosis) یک بیماری قدیمی است که به عنوان یک معضل بهداشتی در سراسر جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه مطرح است. ۱/۳ میلیارد نفر

بیماری به فرم فعال بروز می‌کند. هرچند که بیشتر آلودگی و مرگ و میر سل مربوط به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است، اما در سال‌های اخیر با شیوع بیماری‌های تضعیف کننده سیستم ایمنی مثل ایدز (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS)، پیدایش سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به آنتی‌بیوتیک و عدم کارایی واکسن BCG در بزرگسالان، این بیماری در کشورهای پیشرفته نیز رشد داشته است. بنابراین تلاش برای دستیابی و گسترش ابزارهای پیشگیری و درمان سل یک ضرورت جهانی است. مؤثرترین گام در طراحی استراتژی نوین پیشگیری از این بیماری، انجام مطالعات در راستای طراحی واکسن‌های مناسب است که برای این منظور شناسایی و بررسی انواع آنتی‌ژن‌های باکتری از نظر قدرت ایمنی‌زایی ضروری است [۲].

یکی از مهم‌ترین آنتی‌ژن‌های این باکتری پروتئین‌های کمپلکس ۸۵ است. این مجموعه از سه پروتئین ترشحی مشابه با نام‌های آنتی‌ژن ۸۵A، ۸۵B، ۸۵C تشکیل شده و عملکرد مایکولیل ترانسفراز (Mycolyl Transferase) داشته و در سنتز دیواره باکتری نقش اساسی ایفا می‌نماید. این آنزیم اسید مایکولیک (Mycolic Acids) را از یک تری‌هالوز ۶- -مونومایکولات (Trehalose-6-monomycolate) به دیگری انتقال داده و منجر به تشکیل تری‌هالوز ۶- -۶' دی‌میکولات (Trehalose 6,6'-dimycolate) یا همان فاکتور طنابی می‌شود [۳، ۴]. این پروتئین‌ها به وسیله ۳ ژن جداگانه کد شده و از لحاظ توالی (۶۸-۹۷ درصد) شباهت دارند. این آنزیم‌ها جزو فراوان‌ترین پروتئین‌های ترشحی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است که در مرحله اولیه بیماری ترشح می‌شود و به فراوانی در ماکروفاژهای آلوده به این باکتری یافت می‌شود [۵]. این مطلب تأیید می‌کند که این پروتئین‌ها نقش حیاتی در فیزیولوژی و بیماری‌زایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارد. به تازگی مشخص شده است که پروتئین C از این کمپلکس در اتصال کووالانسی اسید مایکولیک به آرابینوگالاکتان (Arabinogalactan) نقش مهمی دارد [۳، ۶، ۷]. توانایی

ایجاد ایمنی حفاظت کننده، این آنتی‌ژن‌ها را به کاندیدای مناسب برای تولید واکسن بر علیه بیماری سل تبدیل کرده است [۸، ۹]. همچنین این پروتئین‌ها به عنوان هدف در طراحی داروهای ضد مایکوباکتریومی بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است [۱۰-۱۲]. از آنجایی که برای پیشگیری یا درمان بیماری سل، عامل ایمنی‌زا باید توانایی تحریک پاسخ‌های سلولی را داشته باشد [۱۳]، از این پروتئین در تولید واکسن‌های DNAی نو ترکیب و نیز سویه‌های نو ترکیب BCG استفاده شده و تولید خود پروتئین در مقیاس بالا مطرح نبوده است. نتایج تحقیقات اخیر بر استفاده از سویه BCG یا سویه‌های نو ترکیب BCG به عنوان واکسن اولیه و تزریق آنتی‌ژن‌های مایکوباکتریوم به عنوان یادآور تأکید دارد [۱۴]. از طرفی استفاده از خود آنتی‌ژن‌های نو ترکیب به عنوان عامل ایمنی‌زایی مطرح است. از این رو تولید آنتی‌ژن‌های پروتئینی به صورت نو ترکیب برای استفاده در فرآیندهای ایمن‌سازی مورد توجه قرار گرفته است [۱۵، ۱۶].

جایگاه سلولی آنتی‌ژن ۸۵C در دیواره مایکوباکتریوم است که محیطی به شدت آب‌گریز است. آنتی‌ژن ۸۵C همانند سایر ترکیبات موجود در دیواره، خصوصیات غیرقطبی از خود نشان می‌دهد که بررسی‌های آزمایشگاهی و نیز بیواینفورماتیکی این مطلب را تأیید می‌نماید [۴، ۱۷]. تولید پروتئین‌های آب‌گریز به صورت نو ترکیب و استخراج و تخلیص متعاقب آن‌ها از زمینه‌های چالش برانگیز است و تفاوت‌های بسیاری با تخلیص انواع پروتئین‌های محلول دارد. از این‌رو، تولید و تخلیص پروتئین‌هایی از این دست به ابداع استراتژی‌های خاصی هم در سطح طراحی و هم در مورد خالص‌سازی نیاز دارند. تولید و تخلیص آنتی‌ژن ۸۵Cی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پیش از این گزارش نشده ولی در مورد آنتی‌ژن ۸۵A و آنتی‌ژن ۸۵B گزارش‌هایی وجود دارد [۱۸-۲۰].

هدف این مطالعه، کلون ژن آنتی‌ژن ۸۵C از کمپلکس پروتئینی آنتی‌ژن ۸۵ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ساخت یک پلاسمید نو ترکیب با توانایی بیان پروتئین ۸۵C، تولید و در

کلون و بیان مایکولیل ترانسفران

سلول است با دقت خارج و این عمل دو نوبت دیگر تکرار شد. در انتها، میکروتیوب در ۶۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شد تا باقی مانده کلروفرم نیز خارج شود. ۵ میلی گرم لیزوزیم به محتوای درون میکروتیوب اضافه و در ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۱۶ ساعت قرار داده شد. سپس ۵ میلی گرم به ازای هر میلی لیتر آنزیم پروتئیناز K افزوده و ۵ ساعت در ۵۶ درجه سانتی گراد گرمادهی شد. پس از تیمار پروتئیناز K، استخراج ژنوم با استفاده از کیت (Bioneer) Genome AccPure kit و طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت.

آغازگرها (Primers) و شرایط PCR

توالی های ثبت شده ژن آنتی ژن 85C مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بانک ژنی، از پایگاه NCBI (National Center for Biotechnology Information) اخذ و توسط نرم افزار VectorNTI 11 بررسی شد. یک جفت آغازگر برای تکثیر کل ناحیه کد کننده این ژن بر اساس پلاسمید بیانی pET32a(+) (شکل ۱) طراحی شد که عبارتند از:

آغازگر بالادست:

H85CF:
5'AAAAGAGCTCATGACGTTCTTCGAACAGGTGCG3'

و آغازگر پایین دست:

H85CR:
5'AAAAAGCTTTGCTGCCGATGCTGGCTTGCTGGCTC3'

جایگاه برش برای آنزیم *sacI* در انتهای 5' آغازگر بالادست و جایگاه برش برای آنزیم *HindIII* در انتهای 5' آغازگر پایین دست طراحی شد (حروف پررنگ).

تکثیر ژن مورد نظر با PCR توسط آنزیم PrimSTAR[®]HS انجام گرفت. واکنش با برنامه دمایی شامل ۹۸ درجه سانتی گراد به مدت ۳ دقیقه، ۳۵ دوره شامل ۹۸ درجه سانتی گراد (۱۰ ثانیه)، ۶۱ درجه سانتی گراد (۱۰ ثانیه) و ۷۲ درجه سانتی گراد (۱ دقیقه) و در نهایت یک مرحله ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه انجام شد.

نهایت تخلیص این پروتئین نوترکیب است.


مواد و روش ها

سویه های باکتریایی، ناقل ها و آنزیم ها

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه H37Rv از انستیتو پاستور ایران تهیه شد. اشریشیا کلی (*Escherichia coli*) GM2163 و اشریشیا کلی Rosetta gami به ترتیب به عنوان میزبان های تکثیری و بیانی استفاده شد. پلاسمید pJET1.2 از کیت CloneJET[™] ساخت شرکت Fermentas و پلاسمید pET32a(+) (Novagen) برای کلون ژن هدف مورد استفاده قرار گرفت. آنزیم های محدودالایر *SacI* و *HindIII* شرکت Fermentas و T4 DNA لیگاز شرکت TaKaRa استفاده شد. از آنزیم DNA Polymerase[®]HS شرکت TaKaRa برای تکثیر قطعه ژن هدف از ژنوم باکتری با PCR استفاده شد که قدرت تصحیح خطای بسیار بالایی دارد.

استخراج DNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

چند کلونی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه H37Rv در یک میکروتیوب ۲ میلی لیتری حاوی ۵۰۰ میکرولیتر PBS (Phosphate Buffered Saline) وارد و پس از افزودن مقداری پارافین مایع (برای جلوگیری از آئروسول (Aerocol) شدن باکتری) باکتری ها با حرارت غیرفعال شدند. مخلوط حاصل سانتریفوژ و رسوب حاصل دو بار با PBS شستشو داده شد. جسم سلولی باکتری ها در ۲۰۰ میکرولیتر بافر Tris-HCl ۰/۱ مولار با pH: ۸ به شکل سوسپانسیون در آمد. سوسپانسیون باسیل سل ۴ مرتبه با استفاده از نیتروژن مایع و حمام آب گرم (۵۶ درجه سانتی گراد) منجمد و ذوب شد. برای جدا کردن پارافین و نیز ترکیبات آب گریز دیواره باکتری، ۲۰۰ میکرولیتر کلروفرم به میکروتیوب اضافه و پس از ورتکس (Vortex)، در دور $\times g$ ۱۰۰۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ شد. فاز آلی که حاوی کلروفرم و بخشی از چربی های دیواره



شکل ۱ نقشه پلاسمید pET32a-85C

پلاسمیدهای نوترکیب pET32a(+) با هضم آنزیمی و تعیین توالی مجدد (همان‌طور که قبلاً شرح داده شد) انجام گرفت.

بیان و خالص‌سازی پروتئین نوترکیب آنتی‌ژن 85C (rAg85C)

پلاسمید نوترکیب pET32a-85C به میزبان بیانی اشریشیا کلی Rosetta Gami انتقال داده شد. باکتری‌های حاوی پلاسمید نوترکیب (RG-85C) در محیط مایع 2XYT حاوی ۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر آمپی‌سیلین (Ampicillin)، ۳۴ میکروگرم در میلی‌لیتر کانامایسین (Kanamycin)، و ۱۲/۵ میکروگرم در میلی‌لیتر کلرآمفنیکل (Chloramphenicol) و ۱۲/۵ میکروگرم در میلی‌لیتر تتراسایکلین (Tetracycline) تلقیح و یک شب (حدود ۱۸ ساعت) در انکوباتور با حرکت دورانی و دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرماگذاری شد. از این کشت شبانه برای تلقیح محیط مایع 2XYT حاوی ۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر آمپی‌سیلین استفاده شد. محیط مذکور در انکوباتور با حرکت دورانی قرار گرفت و زمانی که کدورت محیط در طول موج ۶۰۰ نانومتر به حدود ۰/۶ رسید، پلاسمیدهای نوترکیب با ۱ میلی‌مولار ایزوپروپیل - بتا- دی- تیوگالاکتوپیرانوزید (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside: IPTG) القا شد. سه نمونه در زمان‌های صفر تا سه از باکتری‌های القا شده گرفته و برای بررسی

کلون آنتی‌ژن 85C

محصول تکثیر ژن پروتئین 85C (۱۰۲۳ جفت‌باز) بعد از تکثیر با آنزیم PrimSTAR[®] HS و خالص‌سازی از روی ژل آگارز، در پلاسمید pJET1.2 طبق دستور کیت CloneJET[™] الحاق و محصول واکنش الحاق به باکتری اشریشیا کلی GM2163 انتقال داده شد. غربالگری پلاسمیدهای حاوی ژن مورد نظر تحقیق حاضر با روش کلونی PCR و با استفاده از آغازگرهای عمومی pJET1.2 و در نهایت آغازگرهای اختصاصی آنتی‌ژن 85C. با هضم آنزیمی پلاسمیدهای نوترکیب، کلون شدن ژن آنتی‌ژن 85C در پلاسمید pJET1.2 تأیید شد. تأیید نهایی پلاسمیدهای نوترکیب، با تعیین توالی انجام گرفت. نتایج تعیین توالی آن‌ها با نرم‌افزار Vector NTI 11.0 (Invitrogen) Advanced[™] بررسی و با توالی‌های مرجع مقایسه شد.

قطعه ژن آنتی‌ژن 85C با هضم آنزیمی توسط آنزیم‌های SacI و HindIII از pJET1.2 خارج و بعد از خالص‌سازی داخل pET32a(+) که توسط همین دو آنزیم بریده و سپس خالص شده بود، مجدداً با واکنش الحاق وارد شد. پلاسمیدهای نوترکیب (pET32a-85C) به باکتری اشریشیا کلی GM2163 منتقل و کلون‌های نوترکیب از طریق PCR روی کلونی با آغازگرهای اختصاصی آنتی‌ژن 85C غربالگری شد. تأیید نهایی

کلون و بیان مایکولیل ترانسفران

نمکی (pH: ۷/۴) به مدت یک شب دیالیز شد. میزان پروتئین با روش اسپکتروفوتومتری تعیین و مقدار کل پروتئین محلول خالص شده از یک لیتر کشت باکتری محاسبه شد.

وسترن بلات (Western Blot)

پروتئین نوترکیب از ژل SDS-PAGE با سیستم انتقال نیمه خشک (Bio-Rad) به کاغذ پلی وینیلیدین دی فلورید (Polyvinylidene Fluoride: PVDF) توسط دستگاه بلات Bio-Rad در شرایط نیمه خشک منتقل شد. برای کنترل انتقال پروتئین از رنگ پانسو (Ponceau S) استفاده و غشا به صورت نوارهای نازک حاوی پروتئین منتقل شده بریده شد. مسدودسازی غشای PVDF با محلول آلبومین سرم گاوی (Bovine Serum Albumin: BSA) ۵ درصد به مدت ۱ ساعت انجام گرفت. در مرحله بعد سه غشای جداگانه با آنتی بادی های پلی کلونال (Polyclonal Antibodies) خرگوشی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس H37Rv (۱:۵۰۰۰)، آنتی بادی بر علیه 6His-tag (۱:۱۰۰۰۰) و سرم بیمار بستری (۱:۲۰۰۰) مبتلا به سل به مدت ۲ ساعت مجاور شدند. شستشو با بافر تریس نمکی محتوی ۰/۰۵ درصد تئوئین ۲۰ (Tris-) (Buffered Saline with Tween: TBS-T) انجام شد غشاها با آنتی بادی های ثانویه (موش ۱:۱۰۰۰۰، خرگوش ۱:۱۰۰۰۰ و انسان ۱:۵۰۰۰) برای مدت ۲ ساعت مجاور شدند. غشاها پس از شستشو با محلول سوبسترای کیمیلومینسانت (Chemiluminescent Substrate) تحت شرایط استاندارد مجاور شده و بلافاصله باندهای فلورسنت روی غشاها را رادیوگرافی ثبت و ظاهر شد.

نتایج

کلون سازی و تعیین توالی آنتی ژن 85C

برای جلوگیری از هر گونه تغییر، ژن پروتئین 85C با ۱۰۲۳ جفت باز به وسیله آنزیم PrimSTAR® HS DNA

میزان بیان پروتئین در زمان های مختلف با SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) در ژل ۱۲/۵ درصد و رنگ آمیزی شده با کوماسی G-250 (Coomassie blue G250) ارزیابی شد.


سلول های کشت RG-85C در ساعت های یک تا سه پس از القا جمع آوری و رسوب داده شدند. رسوب باکتری های مذکور بعد از شستشو با بافر فسفات نمکی، در بافر تخریب (۵۰ میلی مول NaH_2PO_4 ، ۳۰۰ میلی مول NaCl ، ۱۰ میلی مول ایمیدازول (Imidazole) و PMSF (Phenylmethanesulfonylfluoride) با pH: ۸ به شکل سوسپانسیون در آمد و در سه نوبت 5 دقیقه ای با فرکانس ۰/۶ ثانیه تحت اثر امواج فراصوت قرار گرفت تا سلول ها به طور کامل متلاشی شوند. در مرحله بعد، برای جداسازی اجسام جامد از فاز مایع، لیزات سلولی در ۱۸۰۰۰ g برای مدت ۲۰ دقیقه سانتریفوژ شد. یک نمونه از مایع رویی و یک نمونه از رسوب حاصل برای ردیابی پروتئین نوترکیب به وسیله SDS-PAGE بررسی شد.

برای تولید پروتئین نوترکیب rAg85C، یک کشت شبانه از باکتری RG-85C به شکلی که قبلاً شرح داده شد تهیه و از آن برای تلقیح ۱ لیتر محیط تازه 2XYT استفاده شد. بعد از اینکه باکتری ها به کدورت مناسب رسیدند با ۱ میلی مول IPTG القا و سه ساعت پس از آن در ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از طی شدن این زمان، سلول های باکتری با سانتریفوژ در ۹۰۰۰ g جمع آوری و با بافر فسفات نمکی شستشو داده شدند. سلول های باکتری در بافر B (۱۰۰ میلی مول NaH_2PO_4 ، ۱۰ میلی مول Tris-Cl و ۸ مول اوره؛ pH: ۸/۵) حل و پس از انتقال به ستون، با بافر C (۱۰۰ میلی مول NaH_2PO_4 ، ۱۰ میلی مول Tris-Cl و ۸ مول اوره؛ pH: ۸/۵) شستشو داده شدند. حذف اوره با استفاده از بافرهای حاوی شیب کاهشی غلظت اوره (۸، ۶، ۴، ۲، ۱ و ۰ مولار اوره) انجام و در نهایت پروتئین ها با استفاده از محلول ایمیدازول ۲۵۰ میلی مولار از ستون جدا و جمع آوری شدند. برای حذف ایمیدازول، محلول پروتئینی در برابر بافر فسفات

آنزیمی الحاق ژن آنتی ژن 85C در این پلاسمید را تأیید و تعیین توالی نیز درستی آن را تأیید نمود (شکل ۳).


بیان و تخلیص پروتئین نو ترکیب آنتی ژن 85C

نتایج SDS-PAGE، بیان یک پروتئین در محدوده باند ۵۰ کیلودالتونی راهنمای وزنی را نشان می‌دهد که با وزن مولکولی حدود ۵۵ کیلودالتون پیش‌بینی شده همخوانی دارد (شکل ۱). وزن خود پروتئین آنتی ژن 85C حدود ۳۵ کیلودالتون است و اضافه شدن تایوردوکسین (Thioredoxin) به ابتدای آن توسط pET32a(+) موجب افزایش ۱۹ کیلودالتونی آن شده است. میزان بیان پروتئین‌ها بین ساعت اول و سوم تفاوت قابل ملاحظه‌ای نشان نمی‌دهد. با بررسی مایع رویی و رسوب حاصل از تخریب سلول‌ها با روش فراصوت باکتری‌ها با SDS-PAGE مشخص شد که بیشترین مقدار پروتئین نو ترکیب به صورت ذرات جامد غیرمحلول (اینکلوژن: Inclusion) در فاز رسوبی قرار دارد. بررسی الکتروفورتیک نتایج تخلیص rAg85C نشان‌گر خلوص قابل توجه این پروتئین است (شکل ۴).




شکل ۴ نتایج بیان، تخلیص پروتئین و وسترن بلات آنتی ژن 85C؛ **چاهک ۱** راهنمای وزنی پروتئین، **چاهک ۲** سویه اشیریشیا کلی Rosetta gami حاوی پلاسمید pET32a(+) القا نشده، **چاهک ۳** سویه اشیریشیا کلی RG القا نشده ساعت صفر، **چاهک ۴** سویه اشیریشیا کلی RG القا شده ساعت اول، **چاهک ۵** سویه اشیریشیا کلی RG القا شده ساعت سوم، **چاهک ۶** ۲۰ میکروگرم از پروتئین تخلیص شده نهایی، **چاهک ۷** وسترن بلات با آنتی‌بادی ضد ساختار پلی‌هیستیدین، **چاهک ۸** وسترن بلات با آنتی‌بادی پلی‌کلونال خرگوشی، **چاهک ۹، ۱۰، ۱۱** وسترن بلات با آنتی‌بادی سه بیمار مبتلا به سل

Polymerase که دارای قدرت تصحیح خطای بسیار بالایی است تکثیر شد (شکل ۲). به دلیل اضافه شدن توالی‌های شناسایی کننده آنزیم‌های *SacI* و *HindIII* و سه نوکلئوتید اضافی به عنوان دستگیره آنزیمی در دو طرف (جهت کمک به هضم آنزیمی مستقیم در صورت نیاز)، اندازه محصول PCR ۱۰۴۱ جفت‌باز است.



شکل ۲ تکثیر ژن مایکولیل ترانسفر از C با آنزیم PrimSTAR® HS DNA polymerase (۱) تصویر استاندارد راهنمای اندازه DNA، (۲) راهنمای اندازه DNA، (۳، ۴، ۵) محصول تکثیر ژن مایکولیل ترانسفر از C



شکل ۳ نتیجه هضم آنزیمی حامل بیانی pET32a-85C؛ (۱) تصویر استاندارد راهنمای اندازه DNA، (۲) راهنمای اندازه DNA، (۳) هضم تک آنزیمی پلاسمید pET32a(+) با آنزیم *HindIII*، (۴) هضم تک آنزیمی پلاسمید pET32a-85C با آنزیم *HindIII* که حدود ۱ کیلوباز سنگین‌تر از پلاسمید خالی است. (۵) هضم دو آنزیمی پلاسمید pET32a-85C با آنزیم *HindIII* و *SacI* که خروج قطعه ۱ کیلوبازی را نشان می‌دهد.

محصول PCR با موفقیت در پلاسمید pJET1.2 کلون شد. هضم آنزیمی پلاسمیدهای نو ترکیب pJET-85C و تعیین توالی درستی کلون شدن ژن پروتئین 85C را تأیید می‌نماید. مقایسه نتایج تعیین توالی با توالی‌های مرجع نشان داد که هیچ‌گونه تغییر و جهشی در این قطعه ژن کلون شده روی نداده است. کلون ژن آنتی ژن 85C در pET32a(+) نیز با موفقیت کلون شد. هضم

تشخیص و درمان بیماری سل هستند [۲۶-۳۰]. مایکوباکتریوم‌ها به‌طور کلی از نظر ساختار دیواره سلولی تفاوت زیادی با سایر باکتری‌ها دارند. آب‌گریزی شدید ترکیبات موجود در دیواره آن‌ها موجب بروز خواص شاخص مایکوباکتریوم‌هاست که آن‌ها را از سایر ارگانیزم‌های پروکاریوت متمایز می‌سازد [۳۱]. جایگاه پروتئین‌های کمپلکس آنتی‌ژن‌های ۸۵ کیلودالتونی، دیواره مایکوباکتریوم‌ها است و در ساخت آن نقش دارد؛ بنابراین متناسب با محیط سلولی خود، غیرقطبی است [۳، ۶، ۷]. بخش‌های ساختاری غیرقطبی پروتئین و عدم شکل‌گیری تاخوردگی طبیعی آن در یک میزبان پروکاریوتی دیگر مثل اشریشیا کلی موجب نامحلول شدن شدید آن حین تولید به شکل نوترکیب می‌شود. عدم محلولیت ممکن است یک دلیل برای اقبال کم محققین به تولید این گروه از پروتئین‌ها به‌صورت نوترکیب باشد که این‌که گزارشی از تولید آنتی‌ژن ۸۵C به‌صورت نوترکیب در دست نیست.

برای به‌دست آوردن یک پروتئین نوترکیب که به‌طور ذاتی غیرقطبی است، یک راه حل استفاده از حامل‌های پلاسمیدی است که بخش‌هایی را برای افزایش محلولیت محصول پروتئینی به آن‌ها اضافه می‌کنند. میزان آب‌گریزی یک پروتئین نسبت عکس با مقدار تأثیرگذاری این بخش‌ها دارد. یکی از کاراترین حامل‌های پلاسمیدی که برای چنین منظوری استفاده می‌شود، pET32a(+) است که یک پروتئین به نام تایورودوکسین را در بخش ابتدایی مولکول پروتئین مورد نظر اضافه می‌کند (Trx-tag). تایورودوکسین از پروتئین‌های بسیار محلول است و تولید آن در اشریشیا کلی به سهولت انجام می‌شود. افزوده شدن تایورودوکسین به یک پروتئین غیرقطبی باعث ایجاد نوعی قطبیت نسبی و افزایش حلالیت کل محصول در محیط آبی می‌گردد. نکته قابل توجه در این‌جا نوع پاسخ ایمنی است که از این پروتئین انتظار می‌رود. در مسیر عرضه آنتی‌ژن، پروتئین توسط سلول‌های عرضه‌کننده در بدن میزبان به قطعات بسیار کوچک پپتیدی شکسته و به سلول‌های سیستم ایمنی ارایه می‌شود. از این رو شکل فیزیکی و تاخوردگی پروتئین نقش زیادی در عرضه این پپتیدها و در نهایت پاسخ به

براساس اندازه‌گیری با روش اسپکتروفتومتری، به‌دست آوردن پروتئین محلول از یک لیتر کشت باکتری میزبان ۶/۵ میلی گرم تعیین شد. نتایج وسترن بلات نشان می‌دهد rAg85B توسط آنتی‌بادی پلی‌کلونال خرگوشی، آنتی‌بادی علیه بخش پلی‌هستیدین و سرم بیمار قابل شناسایی است (شکل ۴). جمع بین نتایج آزمون وسترن و تعیین توالی ژن آنتی‌ژن ۸۵C تأیید کننده کل فرآیند است.

بحث

بیماری سل و عامل ایجاد کننده آن، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، به‌عنوان یکی از معضلات پیچیده سلامت، محققین را وادار به انجام تحقیقات گسترده‌ای در زمینه پیشگیری و درمان این بیماری کرده است [۲۱، ۲۲]. ایمنی‌زایی تعداد زیادی از ترکیبات سلولی باسیل سل به‌عنوان کاندیدای واکسیناسیون علیه آن مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات گسترده‌ای در زمینه DNA واکسن‌ها و BCG نوترکیب و واکسن‌های زیرواحدی انجام شده است [۱۶]. یافته‌های اخیر نشان داده است که استفاده از DNA واکسن‌ها یا BCG نوترکیب به همراه یک یادآور پروتئینی به‌طور موفقیت‌آمیزی می‌تواند سبب تحریک سیستم ایمنی شود. از سوی دیگر، توانایی برخی آنتی‌ژن‌های پروتئینی به شکل نوترکیب، به تنهایی یا در ترکیب با پروتئین‌های دیگر و ادجوانت‌های (adjuvants) مختلف در ایجاد پاسخ‌های ایمنی حفاظتی گزارش شده است [۱۶، ۲۳-۲۵]. استفاده از ترکیبات پروتئینی به‌عنوان عامل ایمنی‌زا یا یادآور مستلزم تولید آنتی‌ژن‌های پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به‌صورت نوترکیب است. پروتئین‌های کمپلکس آنتی‌ژن‌های ۸۵ کیلودالتونی، فراوان‌ترین پروتئین‌های ترشحی از این باکتری است که در سنتز دیواره نقش مهمی دارد و خاصیت ایمنی‌زایی آن‌ها در خوکچه هندی گزارش شده است. این سه پروتئین (آنتی‌ژن ۸۵A، آنتی‌ژن ۸۵B، آنتی‌ژن ۸۵C) کاندیدای خوبی برای طراحی واکسن،

آن‌ها ندارد و به‌نظر می‌رسد بتوان از این ترکیب پروتئینی برای مقاصد ایمنی‌زایی استفاده کرد. در این مطالعه نیز تولید پروتئین آنتی‌ژن 85C در پلاسמיד pET32a(+) انجام گرفته و یک بخش پروتئینی با جرم حدودی ۱۸ کیلودالتون به ابتدای آن افزوده شده است. میزان بیان پروتئین نوترکیب در میزبان باکتریایی بسیار قابل توجه است و بررسی‌ها با SDS-PAGE حضور پروتئینی با وزن تقریبی ۵۵ کیلودالتون را تأیید می‌نماید. در تولید آنتی‌ژن 85C به شکل نوترکیب در اشریشیا کلی بیشتر پروتئین تولید شده به شکل جسم توده‌ای داخل سلولی است و این به علت عدم تاخوردگی کامل پروتئین مایکوباکتریوم در این میزبان است. راه‌کار مورد استفاده در مورد پروتئین‌هایی که به شکل جسم توده‌ای در داخل سلول میزبان تجمع می‌یابد، به‌کارگیری مواد شیمیایی با خاصیت واسرشته‌کنندگی مانند اوره و گوانیدینوم هیدروکلراید (Guanidinium Hydrochloride) است. مواد واسرشته‌کننده با باز کردن پیوندهای هیدروژنی سبب حل شدن اجسام توده‌ای می‌شود و امکان جذب آن‌ها توسط رزین نیکل را فراهم می‌آورد. اما حضور ماده واسرشته‌کننده استفاده آن را محدود می‌کند. برای حذف این مواد روش‌های متعددی پیشنهاد شده که در مورد پروتئین‌های مختلف، نتایج متفاوتی را در برداشته است. در این مطالعه برای حل کردن اجسام توده‌ای حاوی پروتئین آنتی‌ژن 85C از اوره ۸ مولار استفاده شد. حذف ابتدایی اوره با دیالیز نتایج خوبی در بر نداشت (اطلاعات در این‌جا ذکر نشده) و موجب لخته شدن پروتئین شد. برای به‌دست آوردن پروتئین محلول، روش‌های متعددی استفاده شد و در نهایت با استفاده از محلول‌های شستشو با شیب کاهشی اوره انجام گرفت. با استفاده از این روش در حین این‌که پروتئین به رزین نیکل متصل است، اوره حذف می‌شود و امکان ارتباط پروتئین‌ها با

هم و تجمع و ایجاد لخته را نمی‌دهد و از این لحاظ برتری خوبی به روش‌های دیگر دارد. میزان پروتئین نوترکیب محلول که نتیجه نهایی این روش است نیز نسبت به نتایج روش‌های تخلیص برای پروتئین‌های دیگر کمپلکس ۸۵ قابل توجه است [۱۸-۲۰].

نتایج وسترن با آنتی‌بادی ضد ساختار پلی‌هیستیدین تأیید کننده تولید پروتئین در حامل پلاسמידی pET32a(+) است که با نتایج تعیین توالی سازگاری دارد. نتایج وسترن با آنتی‌بادی پلی‌کلونال خرگوشی از یک طرف تأیید کننده تولید پروتئینی با خصوصیات یک پروتئین مایکوباکتریومی است که به موازات نتایج تعیین توالی تولید آنتی‌ژن 85C را تأیید می‌کند و از طرف دیگر نشان دهنده این مطلب است که پروتئین نوترکیب تولید شده حداقل به‌طور نسبی اپی‌توپ‌های طبیعی خود را حفظ کرده است. از این رو می‌توان ادعا کرد که روش تخلیصی که استفاده شد تا حد قابل قبولی می‌تواند ساختار پروتئین‌های نوترکیب را حفظ نماید. شناسایی آنتی‌ژن 85C نوترکیب توسط سرم بیماران مبتلا به سل که در بیمارستان بستری هستند نشان‌گر این است که پروتئین نوترکیب تولید شده در این پروژه با پروتئینی که باسیل سل حین بیماری تولید می‌نماید و بدن نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد، مشابهت دارد. بنابراین از پروتئینی که با این روش تولید و تخلیص شده می‌توان در زمینه‌های مختلف از جمله تشخیص سرولوژی نیز استفاده نمود.

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته باکتری‌شناسی بوده و با حمایت مالی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

منابع

[1] Thaiss CA, Kaufmann SH. Toward novel vaccines against tuberculosis: current hopes

and obstacles. Yale J Biol Med 2010; 83(4): 209-15.

- [2] Barker LF, Brennan MJ, Rosenstein PK, Sadoff JC. Tuberculosis vaccine research: the impact of immunology. *Curr Opin Immunol* 2009; 21(3): 331-8.
- [3] Dheenadhayalan V, Shin KS, Chang CF, Chang CD, Wang SJ, McDonough S, McDonough P, Stehman S, Shin S, Torres A, Chang YF. Cloning and characterization of the genes coding for antigen 85A, 85B and 85C of *Mycobacterium avium* subsp. paratuberculosis. *DNA Seq* 2002; 13(5): 287-94.
- [4] Ronning DR, Vissa V, Besra GS, Belisle JT, Sacchettini JC. *Mycobacterium tuberculosis* antigen 85A and 85C structures confirm binding orientation and conserved substrate specificity. *J Biol Chem* 2004; 279(35): 36771-7.
- [5] Anderson DH, Harth G, Horwitz MA, Eisenberg D. An interfacial mechanism and a class of inhibitors inferred from two crystal structures of the *Mycobacterium tuberculosis* 30 kDa major secretory protein (Antigen 85B), a mycolyl transferase. *J Mol Biol* 2001; 307(2): 671-81.
- [6] Jackson M, Raynaud C, Lan  elle MA, Guilhot C, Laurent-Winter C, Ensergueix D, Gicquel B, Daff   M. Inactivation of the antigen 85C gene profoundly affects the mycolate content and alters the permeability of the *Mycobacterium tuberculosis* cell envelope. *Mol Microbiol* 1999; 31(5): 1573-87.
- [7] Sanki AK, Boucau J, Ronning DR, Suchack SJ. Antigen 85C-mediated acyl-transfer between synthetic acyl donors and fragments of the arabinan. *Glycoconj J* 2009; 26(5): 589-96.
- [8] Harth G, Lee BY, Wang J, Clemens DL, Horwitz MA. Novel insights into the genetics, biochemistry, and immunocytochemistry of the 30-kilodalton major extracellular protein of *Mycobacterium tuberculosis*. *Infect Immun* 1996; 64(8): 3038-47.
- [9] D'Souza S, Rosseels V, Romano M, Tanghe A, Denis O, Jurion F, Castiglione N, Vanonckelen A, Palfliet K, Huygen K. Mapping of murine Th1 helper T-Cell epitopes of mycolyl transferases Ag85A, Ag85B, and Ag85C from *Mycobacterium tuberculosis*. *Infect Immun* 2003; 71(1): 483-93.
- [10] Gobec S, Plantan I, Mravljak J, Svajger U, Wilson RA, Besra GS, Soares SL, Appelberg R, Kikelj D. Design, synthesis, biochemical evaluation and antimycobacterial action of phosphonate inhibitors of antigen 85C, a crucial enzyme involved in biosynthesis of the mycobacterial cell wall. *Eur J Med Chem* 2007; 42(1): 54-63.
- [11] Ronning DR, Klabunde T, Besra GS, Vissa VD, Belisle JT, Sacchettini JC. Crystal structure of the secreted form of antigen 85C reveals potential targets for mycobacterial drugs and vaccines. *Nat Struct Biol* 2000; 7(2): 141-6.
- [12] Gobec S, Plantan I, Mravljak J, Wilson RA, Besra GS, Kikelj D. Phosphonate inhibitors of antigen 85C, a crucial enzyme involved in the biosynthesis of the *Mycobacterium tuberculosis* cell wall. *Bioorg Med Chem Lett* 2004; 14(13): 3559-62.
- [13] Almeida AS, Lago PM, Boechat N, Huard RC, Lazzarini LC, Santos AR, Nociari M, Zhu H, Perez-Sweeney BM, Bang H, Ni Q, Huang J, Gibson AL, Flores VC, Pecanha LR, Kritski

- AL, Lapa e Silva JR, Ho JL. Tuberculosis is associated with a down-modulatory lung immune response that impairs Th1-type immunity. *J Immunol* 2009; 183(1): 718-31.
- [14] Parida SK, Kaufmann SH. Novel tuberculosis vaccines on the horizon. *Curr Opin Immunol* 2010; 22(3): 374-84.
- [15] Macedo GC, Bozzi A, Weinreich HR, Báfica A, Teixeira HC, Oliveira SC. Human T cell and antibody-mediated responses to the *Mycobacterium tuberculosis* recombinant 85A, 85B, and ESAT-6 antigens. *Clin Dev Immunol* 2011; 351573.
- [16] Martin Montanes C, Gicquel B. New tuberculosis vaccines. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2011; 29 Suppl 1: 57-62.
- [17] Sacchettini JC, Ronning DR. The mycobacterial antigens 85 complex--from structure to function: response. *Trends Microbiol* 2000; 8(10): 441.
- [18] Mullerad J, Michal I, Fishman Y, Hovav AH, Barletta RG, Bercovier H. The immunogenicity of *Mycobacterium paratuberculosis* 85B antigen. *Med Microbiol Immunol* 2002; 190(4): 179-87.
- [19] Salim K, Haedens V, Content J, Leblon G, Huygen K. Heterologous expression of the *Mycobacterium tuberculosis* gene encoding antigen 85A in *Corynebacterium glutamicum*. *Appl Environ Microbiol* 1997; 63(11): 4392-400.
- [20] Xie Y, Bao L, Hu C, Zhang W, Chen W. [Molecular cloning and expression of the immunodominant protein Ag85A from *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv strain]. *Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao* 2002; 33(2): 172-4, 195.
- [21] Jassal MS, Bishai WR. Epidemiology and challenges to the elimination of global tuberculosis. *Clin Infect Dis* 2010; 50 Suppl 3: S156-64.
- [22] Mori T, Leung CC. Tuberculosis in the global aging population. *Infect Dis Clin North Am* 2010; 24(3): 751-68.
- [23] Brooks JV, Frank AA, Keen MA, Bellisle JT, Orme IM. Boosting vaccine for tuberculosis. *Infect Immun* 2001; 69(4): 2714-7.
- [24] Kolibab K, Yang A, Derrick SC, Waldmann TA, Perera LP, Morris SL. Highly persistent and effective prime/boost regimens against tuberculosis that use a multivalent modified vaccine virus Ankara-based tuberculosis vaccine with interleukin-15 as a molecular adjuvant. *Clin Vaccine Immunol* 2010; 17(5): 793-801.
- [25] Lu J, Wang C, Zhou Z, Zhang Y, Cao T, Shi C, Chen Z, Chen L, Cai C, Fan X. Immunogenicity and protective efficacy against murine tuberculosis of a prime-boost regimen with BCG and a DNA vaccine expressing ESAT-6 and Ag85A fusion protein. *Clin Dev Immunol* 2011; 617892.
- [26] Montgomery DL, Huygen K, Yawman AM, Deck RR, Dewitt CM, Content J, Liu MA, Ulmer JB. Induction of humoral and cellular immune responses by vaccination with *M. tuberculosis* antigen 85 DNA. *Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)* 1997; 43(3): 285-92.
- [27] Pardini M, Giannoni F, Palma C, Iona E, Cafaro A, Brunori L, Rinaldi M, Fazio VM, Laguardia ME, Carbonella DC, Magnani M, Ensoli B, Fattorini L, Cassone A. Immune response and protection by DNA vaccines

- expressing antigen 85B of *Mycobacterium tuberculosis*. FEMS Microbiol Lett 2006; 262(2): 210-5.
- [28] Hajizadeh R, Sato H, Carlisle J, Nadaf MT, Evans W, Shepherd BE, Miller RF, Kalams SA, Drake WP. *Mycobacterium tuberculosis* Antigen 85A induces Th-1 immune responses in systemic sarcoidosis. J Clin Immunol 2007; 27(4): 445-54.
- [29] Shi C, Wang X, Zhang H, Xu Z, Li Y, Yuan L. Immune responses and protective efficacy induced by 85B antigen and early secreted antigenic target-6 kDa antigen fusion protein secreted by recombinant bacille Calmette-Guérin. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2007; 39(4): 290-6.
- [30] Dou J, Tang Q, Zhao F, Chu L, Chen J, Cao M, Liu C, Wang Y, Li Y, Li JL. Comparison of immune responses induced in mice by vaccination with DNA vaccine constructs expressing mycobacterial antigen 85A and interleukin-21 and *Bacillus Calmette-Guérin*. Immunol Invest 2008; 37(2): 113-27.
- Alderwick LJ, Birch HL, Mishra AK, Eggeling L, Besra GS. Structure, function and biosynthesis of the *Mycobacterium tuberculosis* cell wall: arabinogalactan and lipoarabinomannan assembly with a view to discovering new drug targets. Biochem Soc Trans 2007; 35(Pt 5): 1325-8.