

Investigation of the *E-cadherin* Promoter Methylation in Patients with Colorectal Cancer in Iran

Shahla Mohammad Ganji^{1*}, Elham Samei², Ahmad Hashemi³, Amir Rezagholizadeh⁴, Anooshirvan Kazemnejad⁵, Zahra Mostakhdemin Hosseini⁶

- 1- Assistant Professor, Department of Molecular Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran
- 2- M.Sc., Department of Molecular Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran
- 3- M.Sc. Student, Department of Molecular Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran
- 4- M.Sc. Student, Department of Biology, Islamic Azad University, East Tehran branch, Tehran, Iran
- 5- Professor, Department of Biostatistics, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
- 6- Assistant Professor, Iran Tumor bank, Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

*Corresponding Address: P.O.Code: 1417863171, Department of Molecular Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Shahrak-e Pajohesh, km 15 Tehran- Karaj Highway, Tehran, Iran
Email: shahlamg@yahoo.com

Received: 15/Sep/2013, Accepted: 15/Nov/2013

Abstract

Objective: *E-cadherin* is widely down-regulated and tightly associated with tumor invasion and metastasis in multiple human cancer types. Recent studies have shown that aberrant methylation of the *E-cadherin* gene promoter contributes to its silencing. However, information regarding epigenetic inactivation of *E-cadherin* in colorectal cancer is insufficient. Herein, we correlate association of the methylation of the *E-Cadherin* promoter with pathological features of colorectal cancer as well as history and demographic data.

Methods: We used methylation specific polymerase chain reaction (MSPCR) to examine methylation status of the 5' CpG island of *E-cadherin* along with its expression by using RT-PCR following surgical resection of 66 unrelated patients with colorectal cancer.

Results: Results showed that 35 out of 66 tumor DNA samples (53%) showed aberrant methylations. In contrast, all normal tissues were unmethylated.

Conclusion: The obtained results show a similarity with the Japanese (54.5%) and Greek (55.7%) populations. The results have confirmed methylation of this gene in sporadic colorectal cancer cases (40.8%) in the Iranian population by researchers in Shiraz. These data suggest that epigenetic silencing via aberrant methylation of the *E-cadherin* promoter plays a critical role in the inactivation of this tumor suppressor gene in colorectal cancer.

Keywords: E-cadherin promoter, Methylation, Epigenetic, Colorectal cancer

Modares Journal of Medical Sciences: *Pathobiology*, Vol 16, No 2, Summer 2013, Pages: 75-83

بررسی مولکولی متیلاسیون پروموتور ژن E- کادهرين در بیماران ایرانی مبلا به سرطان روده بزرگ

شهلا محمد گنجی^{۱*}، الهام سامعی^۲، سید احمد هاشمی^۳، امیر رضا قلیزاده^۴، انوشیروان کاظم نژاد^۵،
ژهرا مستخدمن^۶ حسینی^۷

- ۱- استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی زیست فناوری مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
- ۲- کارشناس ارشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی زیست فناوری مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
- ۳- دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی زیست فناوری مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
- ۴- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران
- ۵- استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
- ۶- استادیار، تومور بانک ایران، انتیتوکنسر، بیمارستان امام خمینی، تهران، ایران

*آدرس نویسنده مسئول: ایران، تهران، کدپستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Email: shahlamg@yahoo.com

پذیرش مقاله: ۹۲/۰۸/۲۵

دریافت مقاله: ۹۲/۰۶/۲۵

چکیده

هدف: مطالعات نشان می‌دهد متیلاسیون نابجای پروموتور ژن E- کادهرين باعث خاموش شدن این ژن و در نتیجه کاهش بیان آن می‌شود. ارتباط کاهش میزان بیان این ژن در سرطان‌های مختلف انسانی مشاهده شده است که با مرحله هجوم تومور و متاستاز آن نیز ارتباط دارد. در این راستا این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین متیلاسیون پروموتور E- کادهرين در مبتلایان سرطان روده بزرگ و خصوصیات پاتولوژیکی آن‌ها طرح ریزی شد. هرچند که اطلاعات موجود در خصوص پدیده اپی ژنتیک غیرفعال شدن این ژن در سرطان روده بزرگ هنوز کافی نیست.

مواد و روش‌ها: به این منظور از ۶۶ بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ که رابطه فامیلی نداشتند، نمونه یافته توموری و نمونه سالم (مجاور تومور) تهیه شد. سپس برای حالت‌های متیله و غیر متیله ژن E- کادهرين آغازگر اختصاصی طراحی شد و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ویژه متیلاسیون انجام شد. بیان این ژن در بافت‌ها نیز توسط آزمایش RT-PCR بررسی شد. نتایج با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۱ و آزمون‌های T و Fisher Exact Test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد که ۳۵ تا از ۶۶ نمونه توموری دارای متیلاسیون ژن E- کادهرين بودند (۵۳ درصد) و در هیچ یک از نمونه‌های سالم (مجاور تومور) متیلاسیونی مشاهده نشد. همچنین مشاهده شد میزان بیان این ژن با میزان متیلاسیون نسبت عکس دارد ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری: به دلیل اهمیت نقش اپی ژنتیک در ایجاد سرطان به ویژه سرطان روده بزرگ که متأسفانه در جامعه ما شیوع بالایی دارد، به نظر می‌آید که مهم ترین کار برای انجام استراتژی‌های کارآمد در پیش‌بینی، تشخیص، درمان، پیگیری سرطان روده بزرگ، در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مناسب مانند E- کادهرين است.

کلیدواژگان: پروموتور ژن E- کادهرين، متیلاسیون، اپی ژنتیک، سرطان روده بزرگ

مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب‌شناسی زیستی، دوره ۱۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صفحات: ۷۵-۸۳

مقدمه

سرطان روده بزرگ (Colorectal Cancer)، سومین سرطان رایج و چهارمین دلیل مرگ و میر در جهان است. سالانه حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر در دنیا به علت ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. شیوع این سرطان بیش از ۹ درصد تمام انواع سرطان‌ها است. در سطح جهان سرطان روده بزرگ ۹/۴ درصد از میزان بروز سرطان در مردّها و ۱۰/۱ درصد از این میزان را در زن‌ها شامل می‌شود. شیوع این بیماری در جهان یکنواخت نیست طوری که در ایالات متحده آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و اروپای غربی بیش از ۴۰ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر و در آفریقا و بخش‌هایی از آسیا کمتر از ۵ نفر از ۱۰۰۰۰۰ نفر مبتلا هستند. متأسفانه در ایران وضعیت بسیار نگران کننده است و شیوع بیشتری نسبت به میانگین جهانی دیده می‌شود به‌طوری که در جمعیت ایرانی ۱۶۰ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر مبتلا به این سرطان هستند. سرطان روده بزرگ در ایران، پس از سرطان‌های معده، مثانه و پروستات در مردان، چهارمین سرطان بوده و در زنان بعد از سرطان سینه، دومین سرطان محسوب می‌شود و هر سال حدود ۴۰۰۰ مورد جدید با مرگ و میر سالانه ۱۱۵۰ رخ می‌دهد. میزان بقای یک سال و پنج سال برای زنان به ترتیب برابر با ۸۸ درصد و ۴۵ درصد بوده در حالی که این مقادیر برای مردان به ترتیب برابر با ۸۶ و ۳۹ درصد است. میانگین بقای کل برای سرطان روده بزرگ در ایران ۳/۵ سال برآورد شده است. بدترین وضعیت بقا برای بیماران جوانتر از ۲۰ سال و بیماران مسن‌تر از ۸۰ سال دیده شده است. در مطالعات انجام شده طی سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵، میزان بقای سرطان روده بزرگ در ایران ۴۱ درصد به دست آمد که قابل مقایسه با بعضی از کشورهای پیشرفته است [۱]. بنابراین سرطان روده بزرگ یکی از کشنده‌ترین سرطان‌ها محسوب می‌شود. فقدان عالیم زودرس اولیه سبب می‌شود تا در زمان تشخیص، بیماری در مراحل پیشرفته باشد.

زن E- کاده‌رین یک گلیکوپروتئین عرض غشایی است که روی سطح سلول‌های پوششی (Epithelial Cells) بیان

مطالعه متیلاسیون E- کاده‌رین در سرطان روده بزرگ

می‌شود. در بافت‌های پوششی، نقش میانجی‌گری E- کاده‌رین باعث چسبندگی بین سلولی وابسته به کلسلیم، هموفیلیک و در نهایت نگهداری ساختار سالم بافت می‌شود. دومین (Domain) سیتوپلاسمی E کاده‌رین، از طریق کاتین آلفا (alpha Catenin) و بتا (beta Catenin) به اکتین موجود در اسکلت سلولی متصل می‌شود که این واکنش برای عملکردش ضروری است [۲]. کاهش میزان بیان E- کاده‌رین در مراحل بالاتر و پیشرفته بیشتر کارسینوما (Carcinoma) مشاهده شده است که آن را بـا القـای EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition) در طول تهاجم کارسینوما مرتبط می‌دانند. که مکرراً در طول تهاجم کارسینوما رخ می‌دهد [۳]. EMT شامل تبدیل یک سلول پوششی به یک سلول مزانشیمال (Mesenchymal Cells) است که به‌وسیله یک فنوتیپ متهاجم‌تر و جنبنده‌تر مشخص می‌شود و در واقع یکی از تغییراتی است که در طول فرآیند متاستاز (Metastasis) رخ می‌دهد. این تغییرات به بسیاری از سلول‌های تومور اجازه مهاجرت از ماتریکس خارج سلولی را می‌دهد و در اولین مراحل فرآیند متاستاز از طریق رگهای خونی و لوف مهاجرت می‌کنند. نتایج تمامی مشاهدات از جمله اطلاعات حاصل از سیستم‌های مدلینگ، از این ایده اولیه که E- کاده‌رین می‌تواند به عنوان یک ژن مهار کننده تهاجم لحاظ شود، حمایت می‌کند [۴]. تصور می‌شود غیر فعال‌سازی یا کاهش عملکرد E- کاده‌رین (مولکول اصلی چسبندگی سلولی در سلول‌های پوششی)، یک مرحله مهم در گسترش تومور و متاستاز است. بنابراین در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای درک تنظیم بیان و عملکرد E- کاده‌رین شده است. چندین مکانیسم در تنظیم بیان E- کاده‌رین درگیر است که شامل ژنتیک، اپی‌ژنتیک (Epigenetics) و تغییرات رونویسی است اگرچه تصویر کاملی از چگونگی تنظیم این مولکول هنوز کاملاً روشن نشده است. یکی از دیدگاه‌های مورد توجه در تشخیص سرطان، مطالعه فرآیندهای بیوشیمیایی و مولکولی است. به دلیل وجود رابطه نزدیک بین تولید مثل سلول‌ها و سرطان و با توجه به این

بیماران که حتی دارای یکی از شرایط زیر بودند از مطالعه خارج شدند: اگر محل اولیه سرطان نامشخص بود، اگر بیمار علاوه بر روده بزرگ به نوع دیگری از سرطان مبتلا بود، اگر از نظر بافت شناختی (Histopathological) (برای تومور، تشخیصی غیر از کولورکتال تأیید شده بود، اگر اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه یا گزارش‌های آسیب‌شناسی بیماران در دسترس نبود و در صورتی که بیماران با هم نسبت فamilی داشتند.

استخراج DNA از تمامی نمونه‌های بافتی به روش فنل-کلروفرم انجام شد. سپس DNA‌ها توسط کیت ZymoResearch (Methylation-GoldTM Kit آمریکا) مورد تیمار با بی سولفیت سدیم قرار گرفت. آغازگر (Primer) اختصاصی برای حالت‌های متیله و غیرمتیله ژن E-کاده‌رین طراحی شده مطالعه قبلی همین گروه استفاده شد که توالی آن‌ها به شرح زیر است:

E.cad-meth-F:

5'-TTAGGTTAGAGGGTTATCGCGT-3'

E.cad-meth-R:

5'-TAACTAAAATTCACCTACCGAC-3'

E.cad-Un meth-F:

5'-TAATTTAGGTTAGAGGGTTATTG-3'

E.cad-Un meth-R:

5'-CACAACCAATCAACAAACACA-3'.

آزمایش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ویژه متیلاسیون (Methylation Specific PCR: MSP) برای ژن فوق به شرح زیر انجام شد. ابتدا مواد زیر در حجم ۱۲/۵ میکرولیتر به میکروتیوب اضافه شد: ۱ میلی‌مول dNTPs (Fermentase)، ۰/۲ میکرومول آغازگرهای اختصاصی، ۱۰۰ نانوگرم کانادا، ۰/۵ میکرومول آغازگر اتصال (Annealing)، ۰/۵ U/µL Taq polymerase (Hot start) (Qiagen، آمریکا).

سپس میکروتیوب‌های بالا در شرایط دمایی ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه و سپس ۳۵ چرخه به صورت ۹۵ درجه سانتی‌گراد، اتصال (Annealing) ۵۳ درجه سانتی‌گراد و ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه برای هر دما و در نهایت ۱۰ دقیقه در ۷۲ درجه سانتی‌گراد و در دستگاه ترموسیکلر مدل

Tumor (Genes Suppressor)، نقش مهمی در شناخت سبب‌شناسی (Ethiology)، مکانیسم مولکولی سرطان‌ها و دستیابی به نشانگرهای مولکولی دارد؛ بنابراین در این مقاله با هدف بررسی تغییرات اپی‌ژنتیکی سرطان روده بزرگ، هایپرمیلایشن (Hypermethylation) (پروموتور ژن E-کاده‌رین در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ مطالعه شد. در واقع بررسی هایپرمیلایشن پروموتور ژن E-کاده‌رین که به طور طبیعی نقش ضد تهاجمی دارد و در اکثر سرطان‌ها از جمله سرطان روده بزرگ این نقش به سبب هایپرمیلایشن از بین رفته یا کم رنگ شده است، از اهداف انجام این پژوهه تحقیقی بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه ابتدا جامعه آماری مورد نظر و حجم نمونه با توجه به عواملی چون شیوع سرطان روده بزرگ در ایران [۱]، مطالعات انجام شده قبلی توسط سایر محققین روی این ژن و نتایج بدست آمده، در نظر گرفتن خطاهای نوع اول و دوم، تعداد ۶۶ نمونه توموری و ۳۰ عدد نمونه سالم تعیین شد. این تعداد نمونه از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و بانک تومور ایران تهیه شد. همراه با نمونه‌های بافتی، اطلاعات کاملی در مورد دموگرافی و آسیب‌شناسی (Pathology) بیماران مبتلایان به سرطان روده بزرگ از تومور بانک ایران بدست آمد. بافت‌ها به صورت تازه و در شرایط ازت مایع به فریزر -۷۰ درجه سانتی‌گراد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منتقل شد. همچنین به منظور رعایت قوانین اخلاق زیستی، قبل از نمونه‌گیری از تمامی بیمارانی که مایل به شرکت در این پژوهه تحقیقاتی بودند، رضایت‌نامه‌ای گرفته شد. در نهایت در طول سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، تعداد ۶۶ نمونه بافت توموری تازه از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ و ۳۰ نمونه سالم (بافت مجاور تومور) از همان بیماران به دست آمد. سپس اطلاعات حاصل از بیماران و نمونه‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تعدادی از نمونه‌های

مطالعه متیلاسیون E- کادهرین در سرطان روده بزرگ

بیمار غیر خویشاوند مبتلا به سرطان روده بزرگ مراجعه کننده به بیمارستان بود. این بیماران شامل ۳۰ نفر زن و ۳۶ نفر مرد با میانگین سنی ۴۸/۸۳ سال و طیف سنی ۱۶ تا ۷۴ سال بودند که در این مطالعه شرکت داشتند (جدول ۱). از نظر بافت‌شناسی ۵۶ تا از نمونه‌ها آدنوکارسینوما (Histology) Mucinous (Adenocarcinoma) و ۸ نمونه موسینوس [Colloid] بود. نتایج پاتولوژی که از بیمارستان امام خمینی و TNM (Tumor Node Metastasis) تومور بانک ایران به دست آمد و براساس سیستم شده بود نشان داد که از نظر اندازه اولیه تومور و مهاجرت آن به بافت‌های مجاور، ۱۹ تا از نمونه‌ها T1، ۲۶ تا از نمونه‌ها T2، ۱۷ نمونه T3، ۲ نمونه T4 و ۲ نمونه نیز TX (ناشناخته) بود. همچنین از نظر درگیر شدن گره‌های لنفی ۳۰ نمونه N0 نمونه N1 و ۱۶ نمونه در مرحله N2 بود. از نظر متاستاز هم ۲۰ عدد از نمونه‌ها دارای متاستاز (M1) و ۴۴ نمونه غیر متاستاز (M0) بود و در ۲ نمونه هم متاستاز شناسایی نشده بود (MX) (جدول ۱).

از نظر درجه تمایزی (Grade Differentiation)، ۱۸ عدد از نمونه‌ها مرحله یک (Stage I)، ۱۶ عدد مرحله دو (Stage II)، ۳۰ عدد از نمونه‌ها مرحله سوم (Stage III) و ۲ نمونه از نظر مرحله توموری نامشخص (Stage X) بود.

نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی

نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی نشان داد که ۳۵ تا از ۶۶ نمونه توموری دارای متیلاسیون ئن E- کادهرین بودند (۵۳ درصد) و در هیچ‌یک از نمونه‌های سالم (مجاور تومور) متیلاسیونی مشاهده نشد (شکل ۱). همچنین مشاهده شد که میزان بیان این ئن با میزان متیلاسیون نسبت عکس دارد (P<0.05) (شکل ۲ الف و ب). نتایج به دست آمده تا حدودی با نتایج بررسی سایر محققین در جمعیت‌های ژاپنی (۵۴/۵ درصد) و یونانی (۵۵/۷ درصد) مشابه دارد. همچنین نتایج

.PeQLab, 96 universal gradient, UK thermal cycler قرار داده شدند. نمونه کترول مثبت نیز از شرکت New England Biolab (انگلستان) خریداری شد. پس از الکتروفورز محصول PCR روی ژل آگارز ۱/۵ درصد، مشاهده باند با طول ۱۲۰ جفت باز نشانه وجود متیله بودن پروموتر ئن E- کادهرین و وجود باند با طول ۱۳۰ جفت باز نشانه عدم متیله بودن در نظر گرفته شد.

در مرحله بعد استخراج RNA از بافت‌های سرطانی و RNA سالم (بافت مجاور تومور) به کمک کیت استخراج RNA شرکت Intron (کره جنوبی) و مطابق دستورالعمل آن انجام شد. در ادامه سترز cDNA به کمک کیت Intron و مطابق دستور کار مربوط انجام گرفت.


بیان ئن E- کادهرین با آزمایش RT-PCR بررسی شد. ژن بتا-اکتین (β-actin) نیز به عنوان استاندارد داخلی و ژن خانه‌دار RT-PCR (House Keeping) مورد آزمایش (Annealing) برای این مرحله آزمایش ۵۳ درجه سانتی‌گراد و طول قطعه مورد نظر ۱۷۴ جفت باز بود.

نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده بالا و داده‌های به دست آمده از پرونده بیماران شامل اطلاعات دموگرافی، بالینی و آسیب‌شناختی (Pathologic) آن‌ها توسط نرمافزار SPSS نسخه ۱۱ بررسی شد. از آزمون‌های Fisher Exact test و χ^2 و آزمون t (t-test)، برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد و در صورتی که $P<0.05$ بود، نتایج از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.


نتایج

نتایج آماری حاصل از اطلاعات دموگرافی و پرونده پاتولوژی بیماران

در بررسی حاضر ۶۶ نمونه بافت توموری و ۳۰ نمونه بافت سالم (بافت مجاور تومور) مورد مطالعه مربوط به ۶۶



شکل ۱ بررسی متیلاسیون پروموتور ژن E- کاکتیلرین با آزمایش MSP و آغازگرهای اختصاصی حالت‌های متیله و غیر متیله ژن E- کاکتیلرین برای نمونه‌های بافتی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ روی آگارز ۱/۵ درصد؛ از DNA تیمار شده بیماران برای این آزمایش استفاده شد. چاهک (۱) کنترل مثبت برای حالت غیر متیله ژن E- کاکتیلرین، چاهک (۲) کنترل منفی برای حالت غیر متیله ژن E- کاکتیلرین، چاهک‌های ۳ تا ۷ پسچ تا از نمونه‌های بافتی که برای پروموتور ژن E- کاکتیلرین غیر متیله هستند (نمونه‌های ۴، ۹ و ۱۰)، چاهک (۸) کنترل منفی برای حالت متیله ژن E- کاکتیلرین، چاهک (۹) کنترل مثبت برای حالت متیله ژن E- کاکتیلرین، چاهک‌های ۱۰ تا ۱۴ پسچ تا از نمونه‌های بافتی که برای پروموتور ژن E- کاکتیلرین متیله هستند (نمونه‌های ۲۷، ۲۴، ۴۰ و ۴۲). چاهک (۱۵) اندازه نشانگر مولکولی (۱۲۳ Ladder) جفت‌بازی)



شکل ۲ بررسی بیان ژن E- کاکتیلرین با آزمایش RT-PCR و آغازگرهای اختصاصی ژن‌های E- کاکتیلرین و بتا- اکتین برای نمونه‌های بافتی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ روی آگارز ۱/۵ درصد؛ (الف) چاهک (۱) اندازه نشانگر مولکولی ۱۲۳ Ladder ۱ جفت‌بازی، چاهک (۲) کنترل منفی برای بیان ژن E- کاکتیلرین، چاهک (۳) کنترل مثبت برای بیان ژن E- کاکتیلرین، چاهک‌های ۴ تا ۹ چند نمونه که برای ژن E- کاکتیلرین دارای بیان بودند شامل سه نمونه غیرمتیله برای این ژن (نمونه‌های ۱، ۴ و ۱۰) و دو نمونه بافت سالم (نمونه‌های ۳ و ۲۴)، (ب) چاهک (۱) اندازه نشانگر مولکولی (۱۲۳ Ladder) ۱ جفت‌بازی، چاهک (۲) کنترل منفی برای بیان ژن بتا- اکتین، چاهک (۳) کنترل مثبت برای بیان ژن بتا- اکتین، چاهک (۴) کنترل منفی برای بیان ژن بتا- اکتین دارای بیان بودند شامل سه نمونه غیرمتیله برای ژن E- کاکتیلرین (نمونه‌های ۱، ۴ و ۱۰) و دو نمونه بافت سالم (نمونه‌های ۳ و ۲۴)، چاهک (۵) چند نمونه که برای ژن E- کاکتیلرین (نمونه‌های ۳، ۶ و ۲۷)، چاهک (۶) بیان ژن بتا- اکتین برای سه نمونه بافتی متیله برای ژن E- کاکتیلرین به عنوان کنترل مثبت و ژن بتا- اکتین به عنوان کنترل داخلی در این آزمایش استفاده شد.

حاصل تأییدی بر مطالعه متیلاسیون این ژن روی جمعیت ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ اسپورادیک (Sporadic Colorectal Cancer) توسط محققین دانشگاه شیراز (۴۰/۸ درصد) است [۵]. خلاصه‌ای از نتایج ارزشمند کسب شده در خصوص بررسی متیلاسیون ژن E- کاکتیلرین در جمعیت‌های مختلف دنیا که شامل نوع مطالعه، درصد متیلاسیون ژن E- کاکتیلرین، نوع بافت، نوع جمعیت و منابع مورد استفاده در جدول ۲ آمده است. بیشترین فراوانی مشاهده شده از متیلاسیون سرطان روده بزرگ مربوط به اسپانیا (۷۱/۴ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به کره جنوبی (۲۸ درصد) است.

جدول ۱ اطلاعات دموگرافی و آسیب‌شناسی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ که در این مطالعه مورد بررسی متیلاسیون پروموتور ژن E- کاکتیلرین قرار گرفته‌اند.

سن (بر حسب سال) (میانگین \pm انحراف استاندارد)	> ۶۰ سال ≤ ۶۰ سال
مرد	۴۵/۴ (۴۱ درصد)
زن	۵۴/۶ (۳۹ درصد)
دور	۷۵/۷ (۵۰ درصد)
نژدیک	۲۴/۳ (۱۶ درصد)
I	۲۷/۳ (۱۸ درصد)
II	۲۴/۲ (۱۶ درصد)
III	۴۵/۵ (۳۰ درصد)
ناشناخته	۳ (۲ درصد)
T1	۲۸/۸ (۱۹ درصد)
T2	۳۹/۴ (۲۶ درصد)
T3	۲۵/۸ (۱۷ درصد)
T4	۳ (۲ درصد)
ناشناخته	۳ (۲ درصد)
N0	۴۵/۵ (۳۰ درصد).
N1	۳۰/۳ (۲۰ درصد)
NX	۲۴/۲ (۱۶ درصد)
M0	۳۰/۳ (۲۰ درصد)
M1	۶۶/۷ (۴۴ درصد)
متاستاز	MX (۲ درصد)
تهاجم به غدد لنفاوی	

مطالعه متیلاسیون E- کادهرین در سرطان روده بزرگ

تهاجم و متاباز در ارتباط است، در حالی که جهش‌های E- کادهرین یک اتفاق نادر است. در حالی که عدم بیان و هایپرمتیلاسیون E- کادهرین به طور متناوب دیده می‌شود، جهش‌ها در اغلب تومورها رواج کمتری دارد و در تعداد کمی از تومورهای به خصوص دیده می‌شود [۴].
فقدان یا کاهش بیان E- کادهرین به عنوان یک نتیجه ژنتیکی و مرتبط با تغییرات اپی‌ژنتیک، در مرحله تهاجم و متاباز چندین تومور مختلف انسانی مشاهده شده است.
در مطالعه حاضر نیز ۵۳ درصد متیلاسیون پروموتور ژن E- کادهرین در مبتلایان سرطان روده بزرگ مشاهده شد. از طرفی مطالعات نشان می‌دهد فراوانی متیلاسیون ژن E- کادهرین در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در سایر کشورها، در طیفی از ۲۸ درصد تا ۷۱/۴ درصد [۱۴، ۹، ۶] مشاهده می‌شود.

در زمینه بررسی متیلاسیون E- کادهرین در جمعیت ایرانی و توسط محققین ایرانی، تاکنون سه مطالعه مشابه در سرطان‌های اسپورادیک روده بزرگ، پستان و کارسینومای سلول‌های سنگفرشی بافت دهان (Oral Squamous Cell Carcinoma) منتشر شده است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

بررسی متیلاسیون ژن CDH1 در مبتلایان به سرطان روده بزرگ نوع اسپورادیک در شیراز نشان داد ۲۰ تا از ۴۹ نمونه بافتی بیماران برای این ژن متیله است (۴۰/۸ درصد) [۵]. نتیجه گروه تحقیقی مطالعه کننده متیلاسیون ژن E- کادهرین روی بیماران مبتلا به سرطان پستان در بیماران تبریزی نشان داد که ۹۴ درصد متیلاسیون در پروموتور این ژن دیده می‌شود و در واقع در ۴۷ نمونه بافتی از ۵۰ نمونه، متیلاسیون ژن E- کادهرین را مشاهده کردند [۱۸]. کردی و همکاران در سال ۲۰۱۰ با بررسی بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کارسینومای سلول‌های سنگفرشی بافت دهان در زاهدان نشان دادند که ۶۱/۸ درصد نمونه‌های توموری (۴۴ تا از ۷۶ نمونه) دارای متیلاسیون برای ژن E- کادهرین است [۱۹].
به دلیل اهمیت بررسی متیلاسیون پروموتور ژن E- کادهرین

جدول ۲ فراوانی متیلاسیون پروموتور ژن E- کادهرین در سرطان روده بزرگ در سایر جمعیت‌ها

درصد متیلاسیون (تعداد)	نوع سرطان	مجموع	جمعیت	مراجع
۲۷/۶ درصد (۲۲/۴۲)	CRC	(۱)	سوریا، اندونزی	[۶]
۲۸ درصد (۲۸/۱۰۰)	CRC	(۲)	بوسان، کره	[۷]
۵۴/۵ درصد (۱۲/۲۲)	Por& Muc	(۱)	توکیو، ژاپن	[۸]
۴۳/۹ درصد (۶۶/۴۹)	CRC	(۱)	سنگل، کره	[۹]
۵۵/۷ درصد (۳۴/۶۱)	SCRC	(۱)	آتن، یونان	[۱۰]
۳۹/۶ درصد (۲۱/۵۳)	CRC	(۱)	اسلو، نروژ	[۱۱]
۴۷/۶ درصد (۳۴/۷۳)	CRC	(۱)	اسفکس، تونس	[۱۲]
۵/۹ درصد (۱۱/۱۸۵)	SCRC	(۱)	تایپان، تایوان	[۱۳]
۷۱/۴ درصد (۱۵/۲۱)	CRC	(۱)	بادالونا، اسپانیا	[۱۴]
۴۶ درصد (۱۳/۲۸)	SCRC/UCACRC	(۱)	آکسفورد، امریکا	[۱۵]
۴۳/۶ درصد (۸۸/۲۰۲)	CRC	(۱)	میلان، ایتالیا	[۱۶]

:Sporadic Colorectal Cancer :SCRC :Colorectal Cancer :CRC
Poorly differentiated adenocarcinoma and Mucinous :Por & Muc
Ulcerative :UCACRC :carcinoma of the colon and rectum
:Breast Cancer :BC :Colitis Associated Colorectal Cancer
Oral Squamous Cell Carcinoma :OSCC

بحث

اپی‌ژنتیک یکی از تغییرات قابل توارث و برگشت‌پذیر در بیان ژن است در حالی که در توالی DNA تغییری ایجاد نمی‌کند. یکی از مکانیسم‌های مولکولی اپی‌ژنتیک، متیلاسیون DNA است. افزایش متیلاسیون باعث مهار ژن‌ها و ناپایداری ژنومی شده و کاهش آن باعث فعال شدن ژن‌ها و افزایش نرخ جهش می‌شود. معمولاً کربن شماره ۵ سیتوزین‌های موجود در دنوكلئوتید CpG و سیتوزین رشته مکمل آن در ژنوم مهره‌داران متیله می‌شوند (متیلاسیون متقارن) و این دو سیتوزین متیله در ساختار سه بعدی در شیار بزرگ ماریچ DNA قرار می‌گیرند. الگوی متیلاسیون ژنومی در سلول‌های سوماتیک (Somatic Cells) پایدار و قابل توارث است و تغییر الگوی متیلاسیون که در بسیاری از انواع سرطان‌ها رخ می‌دهد، سبب مهار بیان ژن‌ها و ناپایداری کل ژنوم می‌شود [۱۷].
کاهش بیان E- کادهرین در سرطان روده بزرگ با افزایش

E- کادهرين است.

تشکر و قدردانی

نویسندها برخود لازم می‌دانند از همکاری صمیمانه پرسنل و پژوهشگان محترم بانک تومور ایران، بابت در اختیار گذاردن نمونه‌ها و تمامی اطلاعات بالینی و آسیب‌شناسی مربوط به بیماران، قدردانی نمایند.

به عنوان یک عامل مهم اپیژنتیکی در ایجاد سرطان، پیشنهاد می‌شود مطالعات مشابه روی سایر انواع سرطان و با تعداد نمونه بیشتر انجام شود.

به دلیل اهمیت نقش اپیژنتیک در ایجاد سرطان به‌ویژه سرطان روده بزرگ که متأسفانه در جامعه ما شیوع بالایی دارد، به نظر می‌آید که مهم‌ترین کار برای انجام استراتژی‌های کارآمد در پیش‌بینی، تشخیص، درمان، پیگیری سرطان روده بزرگ، در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مناسب مانند

منابع

- [1] Moradi A, Khayamzadeh M, Guya M, Mirzaei HR, Salmanian R, Rakhsha A, Akbari ME. Survival of colorectal cancer in Iran. *Asian Pac J Cancer Prev* 2009; 10(4): 583-6.
- [2] Ling ZQ, Li P, Ge MH, Zhao X, Hu FJ, Fang XH, Dong ZM, Mao WM. Hypermethylation modulated down-regulation of CDH1 expression contributes to the progression of esophageal cancer. *Int J Mol Med* 2011; 27(5): 625-35.
- [3] Thiery JP. Epithelial-mesenchymal transitions in tumour progression. *Nat Rev Cancer* 2002; 2(6): 442-54.
- [4] Birchmeier W, Behrens J. Cadherin expression in carcinomas: role in the formation of cell junctions and the prevention of invasiveness. *Biochim Biophys Acta* 1994; 1198(1): 11-26.
- [5] Naghibalhossaini F, Hosseini HM, Mokarram P, Zamani M. High frequency of genes' promoter methylation, but lack of BRAF V600E mutation among Iranian colorectal cancer patients. *Pathol Oncol Res* 2011; 17(4): 819-25.
- [6] Darwanto A, Kitazawa R, Maeda S, Kitazawa S. MeCP2 and promoter methylation cooperatively regulate E-cadherin gene expression in colorectal carcinoma. *Cancer Sci* 2003; 94(5): 442-7.
- [7] Kang HJ, Kim EJ, Kim BG, You CH, Lee SY, Kim DI, Hong YS. Quantitative analysis of cancer-associated gene methylation connected to risk factors in Korean colorectal cancer patients. *J Prev Med Public Health* 2012; 45(4): 251-8.
- [8] Kanazawa T, Watanabe T, Kazama S, Tada T, Koketsu S, Nagawa H. Poorly differentiated adenocarcinoma and mucinous carcinoma of the colon and rectum show higher rates of loss of heterozygosity and loss of E-cadherin expression due to methylation of promoter region. *Int J Cancer* 2002; 102(3): 225-9.
- [9] Lee S, Hwang KS, Lee HJ, Kim JS, Kang GH. Aberrant CpG island hypermethylation of multiple genes in colorectal neoplasia. *Lab Invest* 2004; 84(7): 884-93.
- [10] Garinis GA, Menounos PG, Spanakis NE, Papadopoulos K, Karavitis G, Parassi I, Christeli E, Patrinos GP, Manolis EN, Peros G. Hypermethylation-associated transcriptional

- silencing of E-cadherin in primary sporadic colorectal carcinomas. *J Pathol* 2002; 198(4): 442-9.
- [11] Lind GE, Thorstensen L, Løvig T, Meling GI, Hamelin R, Rognum TO, Esteller M, Lothe RA. A CpG island hypermethylation profile of primary colorectal carcinomas and colon cancer cell lines. *Mol Cancer* 2004; 3: 28.
- [12] Miladi-Abdennadher I, Abdelmaksoud-Damak R, Ayadi L, Khabir A, Frikha F, Kallel L, Amouri A, Frikha M, Sellami-Boudawara T, Gargouri A, Mokdad-Gargouri R. Hypermethylation of RAR β 2 correlates with high COX-2 expression and poor prognosis in patients with colorectal carcinoma. *Tumour Biol* 2010; 31(5): 503-11.
- [13] Lin SY, Yeh KT, Chen WT, Chen HC, Chen ST, Chiou HY, Chang JG. Promoter CpG methylation of tumor suppressor genes in colorectal cancer and its relationship to clinical features. *Oncol Rep* 2004; 11(2): 341-8.
- [14] Ramírez N, Bandrés E, Navarro A, Pons A, Jansa S, Moreno I, Martínez-Rodenas F, Zárate R, Bitarte N, Monzó M, García-Foncillas J. Epigenetic events in normal colonic mucosa surrounding colorectal cancer lesions. *Eur J Cancer* 2008; 44(17): 2689-95.
- [15] Wheeler JM, Kim HC, Efstatou JA, Ilyas M, Mortensen NJ, Bodmer WF. Hypermethylation of the promoter region of the E-cadherin gene (CDH1) in sporadic and ulcerative colitis associated colorectal cancer. *Gut* 2001; 48(3): 367-71.
- [16] Miranda E, Destro A, Malesci A, Balladore E, Bianchi P, Baryshnikova E, Franchi G, Morenghi E, Laghi L, Gennari L, Roncalli M. Genetic and epigenetic changes in primary metastatic and nonmetastatic colorectal cancer. *Br J Cancer* 2006; 95(8): 1101-7.
- [17] Bird A. DNA methylation patterns and epigenetic memory. *Genes Dev* 2002; 16(1): 6-21.
- [18] Shargh SA, Sakizli M, Farajnia S, Montazer-Saheb S. Evaluation of methylation pattern in promoter region of E-cadherin gene and its relation to tumor grade and stage in breast cancer. *Afr J Biotechnol* 2011; 10(10): 1745-51.
- [19] Kordi-Tamandani DM, Moazeni-Roodi AK, Rigi-Ladiz MA, Hashemi M, Birjandian E, Torkamanzehi A. Promoter hypermethylation and expression profile of MGMT and CDH1 genes in oral cavity cancer. *Arch Oral Biol* 2010; 55(10): 809-14.